

디자인 로 드	품 목 명	품목번호	버전
		현대물파스에프 88mL/설명서	701010
규 격	가로 : 120mm 세로 : 150mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명, 성상, 효능/효과, 용법용량, 저장방법		
글자포인트 7pt	주의사항		
색 상	PATONE 285C, K		
지 종 / 코팅	70무조		
후 가 공			
비 고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

현대물파스[®] 에프

사용설명서
일반의약품
KGMP

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

■ 유효성분

살리실산메틸(KP)	3g
dL-카피라(KP)	8g
l-멘톨(KP)	7g
클로르페니라민말레산염(KP)	0.1g
토코페롤아세테이트(KP)	0.1g
에녹솔론(BP)	0.05g

- ##### ■ 기타 첨가제 :
- 농글리세린, 스킨케어81-41347, 에탄올, 정제수

【성 상】 특이한 향이 있는 무색 액체

【효능·효과】

- 다용 증상의 진통·소염(항염) : 뱀, 타박상, 근육통, 관절통, 골절통, 요통(허리통증), 어깨결림, 신경통, 류마티스통증
- 피부가려움, 발레물린대
- 동창(연 상처)

【용법·용량】

1일 1~수회(여러 차례) 환부(질환 부위에) 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
 - 1) 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 사람
 - 2) 30개월 이하의 유아
- 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것
 - 1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
 - 2) 습진, 욕 등에 의한 피부부염, 상처 부위, 민감함 피부
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진·발적·충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부부염 등이 나타난 적이 있는 사람
 - 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 3) 습관(습기 찬이)나 미란(깃무름)이 심한 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 5) 순환기 장애 또는 당뇨병 환자
 - 6) 소아경련을 유발할 수 있다.
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 8) 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐, 종창(부기), 가려움, 통증, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
 - 2) 5 ~ 6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

701010-221104

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 인과의사의 치료를 받을 것.
- 5) 약액이 묻은 손이 눈 등 점막에 닿으면 자극이 있으므로 손에 묻은 약액은 잘 씻을 것.
- 6) 사용 전에 잘 흔들어 사용할 것.
- 7) 적용부위를 싸거나 감지 않고, 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출하지 말 것.
- 8) 이 약을 사용한 부위에 물이 닿은 경우, 강한 자극을 느낄 수 있음.
- 9) 피부가 특히 약한 환자는 동일한 부위에 이 약을 연속적으로 사용하지 말 것.
- 10) 알코올 등에 녹을 우려가 있는 것(안경테, 화학성유 등)에는 닿지 않도록 할 것.
- 11) 살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 불 근처에 두지 말 것(인화성 액체에 한함).
- 5) 이 약을 사용 후 뚜껑을 잘 닫지 않으면 약이 쉰 수 있으므로 주의할 것(플라스틱제품, 의류, 목재, 피혁 등에 이 약이 묻으면 손상되거나 얼룩이 질 수 있음).

【포장단위】 45mL, 88mL

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

“누액방지 안전캡 적용”

누액방지 안전캡을 적용하여, 내용물이 밖으로 흐르지 않습니다.

최초 사용시 스펀지 중앙 부분을 '톡' 소리나게 눌러 주시고, 액이 잘 나오지 않으면 톡톡 두드리면서 사용하십시오.

※ 세워서 보관하세요.

※ 기름이 묻은 부위에 사용하시면 스펀지가 파손될 수 있습니다.

※ 사용 후 뚜껑을 닫아 주십시오. 방지하시면 스펀지가 파손될 수 있습니다.

※ 본 제품을 먹거나 눈에 바르지 마십시오.

※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2022년 11월 24일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>) 나 제품문의처 (☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (☎14-3330, 1644-6223)

제조사 : 현대약품주식회사

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : 1666-9979

사용설명서 개정연월일: 2022. 11. 24

