

디자인 애드	품목명	품목번호	버전
	나프젠크림 설명서		220903
규격	가로 : 120mm 세로 : 180mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료의약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	DIC184, DIC582(백)		
지종 / 코팅	70g 모자리 또는 상승하는 지종		
후가공	없음		
비고			

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



소비자 중심
SFCM
Since 2009
현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

광범위 진균 치료제 **나프젠®** (나프티핀염산염)

사용설명서
일반의약품
KGMP

- [원료약품 및 그 분량] 1g 중
 ■ 유효성분 : 나프티핀염산염(USP) 10mg
 ■ 첨가제(보조제) : 벤질알코올 1.1mg
 ■ 기타 첨가제 : 부틸히드록시톨루엔, 세탄올, 소르비탄스테아레이트, 수산화나트륨, 스테아르산, 유동파라핀, 정제수, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜

[성상] 흰색의 크림제

[효능·효과]

다음의 피부진균증

- 백선 : 족부백선(무좀), 수부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선
- 피부칸디다증
- 여러러기
- 조갑손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 피부진균증 : 일 1회(기능하면 취침시) 환부(질환 부위)를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부(질환 부위) 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 조갑손·발톱) 진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(기능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.
 * 재발 방지를 위해 모든 증상이 소실(없어짐)된 후에도 약 2주간 더 사용한다.
 * 치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 및 이 성분에過민증 또는 그 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

드물게 자열감(화끈감), 찔린 상처, 건조감, 홍반(붉은 반점), 가려움, 국소자극이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 이 약 사용으로 인해 자극 또는 민감성이 나타나면 치료를 중지하고 적절한 요법을 실시한다.
- 수산화칼륨용액으로 직접적인 현미경적 검사 또는 적당한 배지에 배양함으로써 질병의 진단을 확인할 수 있다.
- 의사의 지시가 없는 한 밀봉붕대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.

220903

- 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.
- 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 않는다.

5. 상호작용

다른 약물과의 상호작용에 대해 보고된 바 없으므로 다른 국소 적용 약물과 병용(함께 사용)하는 것은 권장되지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 랫트와 토키를 대상으로 한 동물실험에서 사람에 대한 투여량의 150배 또는 그 이상의 용량을 경구투여한 경우에 이 약으로 인한 임신장애 또는 태아독성에 대한 뚜렷한 증거가 나타나지 않았다.
- 임부에 대한 적절한 임상 연구가 수행되지 않았으며 동물실험결과가 사람에게도 항상 똑같이 적용되는 것은 아니므로 임부 또는 임산하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여한다.
- 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려진 바 없으나 많은 약물들이 모유로 배출되므로 수유부에 이 약 투여시 특히 주의 한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 적용상의 주의

- 이 약은 외용으로만 적용한다.
- 급성염증 또는 노출된 상처 부위에는 적용하지 않는다.
- 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다.

9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[포장단위] 30g/튜브

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- 오용(잘못 사용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- 이 사용설명서 개정연월일(2022년 09월 30일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎14-3330, 1644-6223)

제조의뢰자 : 현대약품주식회사
총장남도 천안시 동남구 풍세면 진다리길 55
제조자 : 태극제약주식회사
총장남도 부여군 초촌면 금백로 821

제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 개정연월일 : 2022. 09. 30

