


디자인앤드	품 목 명	품목번호	버전
	아데노포스주 설명서 (위탁)	701792	220200
규 격	가로: 115mm 세로: 151mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	전문약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법 행간 : 7pt		
색 상	DIC582(적), Pantone 344 C		
지 중 / 코팅	모조지 70g		
후 가 공			
비 고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

아데노포스® 주

(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물)

사용설명서

전문약품

KGMP

주사용

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

- 유효성분: 아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물(KP) 10,98mg
(아데노신트리포스페이트이나트륨으로서 10,0mg)
- 기타 첨가제
 - 안정제 : L-아르기닌(USP) 10mg
 - 무통화제 : 벤질알코올(KP) 15mg
 - 용제 : 주사용수(KP) 적량

【성 상】 무색 투명한 액이 무색 투명한 앰플에 든 주사제

【효능·효과】 다음 질환에 수반하는 여러 증상의 개선 :
근무력증, 심부전, 만성간염에 있어서의 간기능의 개선, 두부외상 후유증, 조절성 안정피로

【용법·용량】
아데노신트리포스페이트이나트륨으로서 보통 성인 1회 5~20mg을 1일 1~2회 피하, 근육 또는 정맥주사 한다. 정맥주사 인 경우 포도당주사액 10~20mL에 혼합한 후 3~5분간에 걸쳐 천천히 주사한다. 연령 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 앰플주사제는 용기 절단 시 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 소아, 고령자 사용 시에는 각별히 주의한다.

2) 벤질알코올은 조숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고되었다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후의 환자(뇌혈관확장에 의해 재출혈의 가능성이 있다.)
- 2) 신생아, 미숙아 (벤질알코올을 함유하고 있다.)
- 3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

3. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 흉부불쾌감, 구역, 안면홍조, 기침, 딸꾹질, 발열 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 가슴이 답답함, 일과성 심계항진, 부정맥 등이 나타날 수 있다.

701792-220200

- 3) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진, 위통, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 호흡기계 : 기침발작이 나타날 수 있다.
- 5) 중추신경계 : 두통이 나타날 수 있다.

4. 상호작용
디피리다몰은 이 약의 분해산물인 아데노신의 혈중농도를 상승시켜, 이 약의 심혈관에 대한 작용을 증강시킨다는 보고가 있으므로 병용투여 시 주의한다.

5. 임부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하여 투여한다.

8. 적응상의 주의
정맥 내에 신속히 주사하면 일시적인 흉부불쾌감, 구역, 두통, 안면홍조, 기침, 딸꾹질, 발열, 기관지경련 등을 일으키는 경우가 있으므로 주사의 속도는 가능한 한 느리게 한다.

【포장단위】 2mL리터/앰플(10앰플/상자)


【저장방법】 밀봉용기, 냉장(2~8℃)보관

- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 사용함으로써 일레르기 증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 이 사용설명서 작성연월일(2022년 03월 04일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎1666-9979) 에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (☎14-3330, 1644-6223)

제조뢰의자 : 현대약품(주)
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제 조 자 : 동광제약(주)
경기도 평택시 산단로 115

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 사용설명서 작성연월일 : 2022. 03. 04



현대약품(주)