

드로잉	품목명	품목번호	버전
		위푸린에스산/설명서	700025
규격	가로 : 120mm 세로 : 170mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명, 성상, 효능/효과, 용법용량, 저장방법		
글자포인트 7pt	주의사항		
지종 / 코팅	70모조		
후가공			
비고			
색상	PANTONE Blue 072U, K		



현대약품은 제약업계 최초  
CCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경영을 실천합니다

## 생약성분의 복합 소화제 위푸린에스산

사용설명서  
일반의약품  
KGMP

### 【원료약품 및 그 분량】 1포(3.0g) 중

* 유효성분 : 고목가루(생규).....	15.0 mg
육계가루(생규).....	92.0 mg
회향가루(JP).....	24.0 mg
육두구가루(생규).....	20.0 mg
정향가루(생규).....	12.0 mg
진피가루(별규).....	22.0 mg
웅담가루(생규).....	15.0 mg
탄산수소나트륨(KP).....	625.0 mg
침강탄산칼슘(KP).....	133.0 mg
탄산마그네슘(KP).....	26.0 mg
합성규산알루미늄(KP).....	273.4 mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000II(KP) (전분당화력 250단위 이상, 전분호정화력 210단위 이상).....	40.0 mg

\* 동물유래성분 : 유당수화물/소/우유

\* 기타첨가제 : 엘-멘틀, 옥수수전분

【성상】 갈색의 산제

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕 감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

【용법·용량】 성인(15세 이상) : 1회 1포

1일 3회, 식후 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용하십시오.

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않는다. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
- 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

#### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 테트라사이클린계 항생제

#### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장(콩팥)장애 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

#### 4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

#### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

#### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 120포/상자(3.0그램/포x120), 30포/상자(3.0그램/포x30)

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환 하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2022년 11월 09일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(☎ 1644-6223, 14-3330)

제조사 : 정우신약(주)  
충정남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60  
판매자 : 현대약품(주)  
충정남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979  
사용설명서 개정연월일:2022. 11. 09

