


| 큐더스 커뮤니케이션즈 | 품 목 명 | 품목번호 | 버전 |
|----------------|----------------------------------------------------------|------|--------|
| | 등근머리버물리크림 설명서 | | 220803 |
| 규 격 | 120x180mm | | |
| 바코드규격 | - | | |
| 글자포인트 7pt | 기재사항, 원료약품 및 그 분량, 성상, 효능효과, 용법용량, 사용상의 주의사항, 포장단위, 저장방법 | | |
| 글자포인트 7pt | 제조의뢰자, 제조자, 제품문의처 외 전체(사용설명서,분류번호,일반의약품 8pt) | | |
| 색 상 | Pantone 1235, Black | | |
| | - | | |
| 지중 / 코팅 | | | |
| 후가공 | - | | |
| | - | | |
| 비 고 | | | |



현대약품은 계약업체 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

연약한 피부를 위한 -

버물리크림

사용설명서

일반의약품
KGMP

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 분량】 1g 중

- 유효성분
- 디펜히드라민(KP) 10mg
- 덱스판테놀(USP) 10mg
- 토코페롤아세테이트(KP) 10mg
- 글리시리진산이칼륨(KP) 5mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg, 파라옥시벤조산프로필 1mg
- 기타 첨가제 : 글리세린, 디메티콘, 무수인산일수소나트륨, 부틸렌글리콜, 세탄올, 소르비탄모노스테아레이트, 스테아릴알코올, 유동파라핀, 정제수, 카보머 940, 폴리에틸렌글리콜모노스테아레이트

【성상】 백색의 크림제

【효능·효과】 가려움, 피부염, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레 물림, 짓무름

【용법·용량】 1일 수회(여러 차례) 환부(질한 부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람(부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.
 - 생후 1개월 미만의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
 - 3) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
 - 4) 습윤(습기 참)이나 염증이 심한 환자
 - 5) 6세미만의 영아(갓난아기)·유아
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
 - 2) 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 3) 다음의 경우에는 가능한 빨리 의사에게 진찰을 받을 것.
 - (1) 대량(약 10g 이상) 삼켰을 때
 - (2) 헛기증(어지럼), 구역질, 권태감(노곤함), 호흡 이상 등이 있을 때

220803

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지시·감독하에 사용할 것.
 - 3) 어린이나 고령자(노인)가 본 제품을 경구로 복용한 경우, 조금 씩은 정도로는 영향이 없다. 단 많이 먹으면 졸음이 오는 경우가 있다.
 - 4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
 - 5) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우는물로 씻는다. 증상이 심한 경우(충혈이나 아픔이 계속되거나, 눈물이 멈추지 않는 경우 등)에는 인(눈)과의사의 진료를 받을 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한 내의 제품일지라도 품질 유지를 위해 개봉 후는 가능한 빠르게 사용할 것.

【포장단위】 25g/튜브


【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 환부(질한 부위) 이외에 사용하지 마십시오.
- ※ 개봉후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관하여 주십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 개정연월일 : 2022년 08월 24일 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(☎1644-6223, 14-3330)

제조의뢰자 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍서면 잔다리길 55

제조자 : 태극제약주식회사
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

☎ 제품문의처 : 1666-9979
사용설명서 개정연월일 : 2022년 08월 24일



현대약품(주)