

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	마이녹실액5% 쿨멘톨 설명서	700751	220705
규격	가로 : 160mm 세로 : 280mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	DIC172, DIC582(백)		
지중 / 코팅	70g 모조지 또는 상응하는 지중		
후가공	없음		
비고			



소비자 중심  
Since 2009  
KCCM  
한국제품은 제약업계 최초  
KCCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경영을 실천합니다.



사용설명서  
일반의약품  
KGMP

[www.hyundaipharm.co.kr/minoxyl](http://www.hyundaipharm.co.kr/minoxyl)

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

#### [원료약품 및 그 분량] 100mL중

- 유효성분 : 미녹시딜(USP) ..... 5.0g
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 텍스판테놀, 부틸레이트하이드록시아니졸, 시트르산, 에탄올, L-멘톨, 정제수, 코포비돈, 토코페롤아세테이트

#### [성상] 특이한 향이 있는 무색 또는 미황색의 투명한 액체

#### [효능·효과] 남성형 탈모증(안드로겐탈모증)의 치료

##### 남성형 탈모증이란?

남성형 탈모증은 허지기 상태에 있는 모낭수에 비해 성장기 모낭수의 비율이 감소되어 모낭이 점차 축소되는 현상을 말합니다.  
남성 호르몬(hormone)의 일종인 테스토스테론이 5α-환원 효소에 의해 DHT(디아이하이드로테스토스테론)로 변환되어 되어 모발의 생장 주기 중 생장기를 짧게 하고 헤지기를 길게 하여 결국 생장주기를 거듭할수록 모낭의 크기를 위축시키므로 탈모를 유발합니다.  
이 남성호르몬은 여성에게도 탈모를 일으킬 수 있는데, 그 이유는 남성의 고환에서 분비되는 탈모를 일으키는 안드로겐이 여성의 경우에도 난소와 부신(종양위생)에서 분비되기 때문입니다.


즉 남성형 탈모증은 남성에게만 발생되는 증상이 아니라 여성에게도 나타날 수 있습니다.

#### [용법·용량]

- 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환 부위)에만 바릅니다.
- 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

#### 사용방법

\* 미녹실액5% 쿨멘톨 180mL 제품에는 휴대용기가 동봉되어 있습니다. 동봉된 휴대용기에 본품의 미녹실액을 넣어 아플리케이션을 결합하여 사용하십시오. (본품에는 아플리케이션이 결합되지 않습니다. \* 아플리케이션 : 스프레이, 스포이드, 정량캡)



- | 스프레이 사용시  | 스포이드 사용시   | 정량캡 사용시   |
|---|--|---|
| - 사용하실 때에는 스프레이에 정착된 보관용 캡을 분리 후 도포하시고 바르시고, 보관시 다시 보관용 캡을 기우시기 바랍니다. | - 스프레이는 1분 분무시 약 0.18mL가 분사되며 3~5번 분무하시기 바랍니다.                                 | - 용기에 스포이드를 꽂아 0.5mL~1mL 눈에 맞추어 속량 후 꼭기로 헌법 놀라 탈모 부위에 고르게 도포 하십시오.                        |
| - 스프레이를 분사하는 동안에는 스프레이를 용기로 정착하시기 바랍니다.                               | - 일시 또는 장기간 사용을 중단할 경우 분무구가 막혀서 미녹실 액액이 분사되지 않을 수도 있으며, 스프레이 고장의 원인이 될 수 있습니다. | - 보관시에는 스포이드를 용기로 정착하시기 바랍니다.(60mL는 제품용기, 180mL는 휴대용기)                                    |
| - 사용종지 후 재사용할 경우 스프레이 분무구를 깨끗이 닦고 사용하세요.                              | - 스포이드는 안전캡으로 되어 있습니다. 스포이드를 재사용하실 때에는 캡부분을 아래로 누른 상태에서 오른쪽으로 둘려주시기 바랍니다.      | - 정량캡을 용기에 맞추어 넣은 후 시계방향으로 돌려서 잡그신 후 용기를 빠로 세워 정량캡의 검은색(1mL)까지 미녹실 액액이 차도록 용기를 꽂 놀라 주십시오. |
|   |  | - 용기를 거꾸로 하여 정량캡 내의 미녹실 액액이 없어질 때까지 두피에 두드리며 사용하시기 바랍니다.                                  |

#### [사용상의 주의사항]

##### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 여성 환자
- 18세 미만 환자
- 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 신혈관계 질환 환자(심장동맥(심장동맥) 질환, 부정맥, 혈관성부전, 심장판막 질환, 치료받거나 혹은 치료받지 않은 고혈압, 저혈압 환자)
- 탈모의 유전적 요인이나 없는 환자
- 긴장증(부정맥)으로 탈모되는 환자
- 두피의 흥분(반응), 염증, 감염, 자극 또는 통증, 건선(마른비늘증), 일광화상(햇볕화상) 등의 두피 이상 환자
- 원인 불명의 탈모 환자
- 다른 두피용 약물을 사용 중인 환자
- 두피를 면도한 환자
- 2%에 내약성이 좋지 않은 환자

##### 2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것

- 외용 코르티코이드, 레티노이드, 베셀린, 디트리놀 또는 경피흡수를 촉진시킨다고 알려진 약물과 함께 사용하지 않는다.
- 임상적으로 입증된 비는 없으나 구아네티핀 등의 혈관확장제를 계속 투여 중인 환자에 있어서 기립저혈압을 증가시킬 수 있다.

##### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 고령자(노인)(55세 이상 환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다)
- 부종(부기)이 있는 환자
- 갑상샘 기능 장애(갑상샘기능저하증, 갑상샘기능증) 환자

##### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 피부 : 가려움, 인설(비늘), 흥분(반응)/발작(충혈되어 붉어짐), 피부염, 피부건조, 이 약을 바른 부위 이외의 다모증(탈과다증)(여성의 경우 안면털 성장), 모낭염, 작열경화(끈감) 및 피진(피부 발진)을 포함한 국소 자극, 빅리(벗겨짐), 탈모, 피부 농양(고름집), 여드름, 조각증(여드름, 벌집 병), 지루, 습진, 모발이상 등이 나타날 수 있다.

700751-220705

- 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 때때로 흉통(가슴통증), 혈압변화, 맥박변화, 심계항진(두근거림), 심박동의 증가, 심낭(심출), 심마염, 전색(혈관막염), 빈맥(빠른맥), 기존에 존재하던 협심증의 악화 또는 진단 받지 않은 관상동맥(심장동맥) 질환자에서 협심증의 유발 등의 전신작용이 나타날 수 있다(단, 빈맥(빠른맥) 및 협심증은 베타아이드레날린단제 등 교감신경단제로 조절할 수 있다).
- 호흡기계 : 기관지염, 삼기도(기관지염, 부비동염, 호흡곤란) 때때로 호흡의 단축 등이 나타날 수 있다.
- 자율신경계 : 때때로 골절, 배통(backache)(등 통증), 건강(흉출증), 통증(통증), 신경염(다발성 신경염/여러신경염) 등, 쇠약 등이 나타날 수 있다.
- 중추신경계 : 때때로 어지럼, 두통, 몽롱함, 실신 등이 나타날 수 있다.
- 간장 : 때때로 간염이 나타날 수 있다.
- 신장 : 때때로 부종(부기), 신경설(설), 혈 및 체액저류(체액고임)가 나타날 수 있다(단, 체액저류(체액고임) 및 부종(부기)은 필요시 이뇨제로 치료할 수 있다).
- 과민반응 : 때때로 열, 두드러기, 알레르기(비염/코염), 전신성 흥분(반응) 및 안면부종(얼굴 부기), 오한(춥고 떨리는 증상) 등이 나타날 수 있다.
- 기타 : 때때로 안구자극, 쓴맛, 이염(귀염)(특히 외이염), 미각변화, 시력장애, 별기부전, 찌르는 것 같은 아픔, 갑작스러운 원인불명의 체중증가 등이 나타날 수 있다.
- 11) 이 약의 사용으로 인해 초기에 일시적으로 탈모가 증가될 수 있는데, 2주 이상 지속될 경우
- 12) 이 약을 사용하고 4개월 후에도 효과가 없는 경우

#### 5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 이 약의 오용(잘못 사용) 및 개인의 감수성 등의 차이로 인해 과도하게 흡수되는 경우 심혈관계에 영향을 미치는 등 전신작용이 나타날 수 있으므로, 사용 전 의사 또는 약사와 상의한다.
- 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사는 환자의 건강과 두피의 이상을 확인하여야 한다. 국소 빅리(벗겨짐), 피부염, 두피의 건선(마른비늘증), 심한 증상의 화상 등은 이 약의 흡수를 증가시켜 이상반응의 위험성을 증가시킬 수 있다. 또한 이 약의 사용을 고려하고 있는 환자는 병력 및 신체검사를 해 보아야 한다. 심질환의 병력이 있는 환자는 이상반응이 발생하면 특히 심한 증상이 될 수도 있다는 것을 알아야 한다.
- 3) 이 약의 사용을 잊은 경우에도 용량을 보충하지 않고 그대로 다른 용량을 적용하는 것이다.
- 4) 이 약은 다음의 원인에 의한 탈모 및 기타 피부병에는 효과가 없다.
  - 약물, 영양상태(철 결핍, 고지민의 비타민A 섭취), 갑상샘기능저하증, 화학요법, 두피에 흉터를 유발하는 질환, 두피에 흉터 또는 깊은 화상을 유발하는 모발관리제품, 모발을 뜯는 등의 손질, 지속적인 남성호르몬, 10년 이상의 장기 탈모, 선천적인 탈모
- 5) 과량투여시의 처리
  - (1) 이 약을 복용하거나 권장량보다 과량을 넓은 부위에 사용 또는 두피 이외의 부위에 사용하는 경우(2%의 경우 5mL, 3%의 경우 3.3mL, 5%의 경우 2mL) 미녹시딜 100mg를 험유하는데 이는 고혈압 치료를 위한 성인의 경우 최대용량이다) 전신 흡수 증가로 인해, 미녹시딜의 혈관 확장작용과 관련된 전신적 효과가 나타날 수 있는데, 약물 과량사용의 증상 및 장후의 대부분은 체액저류(체액고임), 혈압강화 및 빈맥(빠른맥)과 관련된 심혈관계 작용이다.
  - (2) 이 약을 복용한 경우 심한 증상의 이상반응을 유발할 수 있으므로 즉시 의사 또는 약사와 상의한다.
  - (3) 체액저류(체액고임)는 이뇨제로 적절히 치료될 수 있으며, 빈맥(빠른맥)은 베타아이드레날린단제의 복용으로 조절될 수 있다.
    - 저혈압 시는 생리식염 주사액을 정맥내로 투여한다. 노르에피네프린, 에피네프린과 같은 교감신경분지에는 과도하게 심장을 자극하므로 피해야 한다.
  - (4) 이 약 사용으로 심한 증상의 이상반응이 나타날 수 있으므로 외용으로만 사용하고 두피 이외의 부위에는 사용하지 않는다.
  - 7) 일봉봉대법을 사용하지 않는다.
  - 8) 이 약 사용으로 눈의 화상 및 자극이 나타날 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고 눈, 벗겨진 피부 및 점막 등 민감한 부위에 이 약이 닿으면 즉시 깨끗한 물로 씻어낸다.
  - 9) 이 약을 사용한 후에는 손을 깨끗이 씻는다.
  - 10) 헤어스타일제는 이 약이 마른 후 사용하고, 저녁에 사용할 때는 이 약의 건조를 위해 취침 2~4시간 전에 사용한다.
  - 11) 두피에서 공기 순환되면 이 약의 효과가 감소될 수 있으므로, 이 약의 건조를 촉진시키기 위해 헤어드라이어를 사용하지 않는다.
  - 12) 동물실험 결과 미녹시딜에 의해 암컷 마우스에서 유방암 및 부신종양이 발생하였고 수컷 캣트에서 부신 및 표피종양이 나타났다는 보고가 있다.
6. 저장상의 주의사항
  - 이 약은 인화성이 있으므로 화기로 피한다.
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 의약품을 원래 용기에서 끼어내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[포장단위] 60mL, 180mL, 360mL

#### [저장방법] 차량기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- \* 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- \* 이 약을 사용으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- \* 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- \* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- \* 이 사용설명서 개정연월일(2022년 07월 25일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- \* 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979  
사용설명서 개정연월일 : 2022. 07. 25

제조자 : 현대약품주식회사  
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

