

복합 마이녹실 5%



[특·장점]

유해산소로부터 피부를 보호하는 항산화작용의 토코페롤, 급만성/지루성 습진, 접촉성 피부염에 효과가 있는 피리독신을 복합 적용

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

미녹시딜(USP)	50mg
피리독신염산염(KP)	0.5mg
토코페롤아세테이트(KP)	0.8mg
L-멘톨(KP)	3mg

[효능·효과]

남성용 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 240mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실 5%



[특·장점]

전국 14개 대학병원임상(170명)
대한피부과학회 (2009;47(3):295~302)
높은 치료효과 확인 92.9% 모발개수 및 굵기 증가

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP)	5.0g
-----------	------

[효능·효과]

남성형 탈모증 (남성에 한함)

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 315mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실플러스 5% 쿨타입



[특·장점]

L-멘톨 함유로 끈적임이 적고 시원한 프리미엄급 탈모증 치료제
PG 미함유, 보습제 텍스판테놀 함유

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) 5.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(단, 5%는 남성에 한함)

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 180mL, 360mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실 3%



[특·장점]

5%에 비해 부작용이 감소되어 예민한 여성의 두피에 맞춤형 제품
PG 미함유로 두피 트러블 최소화

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) 3.0g

텍스판테놀(USP) 1.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 남성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 90mL, 180mL(리필용)

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실 S 캡슐



[특·장점]

남녀공용 비호르몬 성분의 먹는 탈모증치료제 “1일 3회, 1회 1캡슐 복용”

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

케라틴(별규)	20mg(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg)
약용호모(별규)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	60mg
파라아미노벤조산(USP)	20mg
질산치아민(KP)	60mg
L-시스틴(KP)	20mg

[효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용 / 소아: 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

[포장단위] 90C, 120C, 180C, 360C

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실겔 5%



[특·장점]

국내 최초 흐르지 않는 겔 타입, 마사지가 가능한 미니 둥근머리 후대가 간편하여 여행시 편리!

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

미녹시딜(USP) 50mg

[효능·효과]

남성형 탈모증 (남성에 한함)

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g [저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실겔 3%



[특·장점]

손댈 필요없이 두피에 직접 바르세요. 흐르지 않아 위생적인 겔타입 후대가 간편하여 여행시 편리!

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

미녹시딜(USP) 30mg

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 남성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

등근머리 버물리겔



[특·장점]

흐르지 않고 흡수가 빠른 겔타입 제형!
마사지 기능의 등근머리 용기, 벌레물려 가려울땐 - 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

dl-캄파(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
L-멘톨(KP)	3g
디부카인염산염(KP)	0.3g
디펜히드라민염산염(KP)	2g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동창(언 상처) 벌레물린데, 두드러기

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

25g, 50g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

등근머리 버물리키드크림



[특·장점]

연약한 피부의 유아와 여성을 위한 저자극 크림타입 제형
생후 1개월 이상 사용가능

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

디펜히드라민(KP)	10mg
덱스판테놀(USP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	10mg
글리시리진산이칼륨(KP)	5mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	1mg
파라옥시벤조산프로필	1mg

[효능·효과]

가려움, 피부염, 피부병, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레물림, 긁무름

[용법·용량]

1일 수회 (여러차례) 환부(질한부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위]

25g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리에스액 스펀지타입



[특·장점]

벌레물림시장 No.1 브랜드 버물리!
30개월 이상부터 사용할 수 있어요~
오랜시간 사랑받은 우리가족 여름상비약!

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
글리시레틴산(식품의약품 안전본부고시 제96-2호)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 미란(젖무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동창(연 상처) 벌레물린데, 두드러기

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

50mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리에스액 솔타입



[특·장점]

가려울때 긁어주는 편리한 솔타입
LDPE 특수재질로 부드럽고 위생적
벌레물려 가려울땐- 버물리, 우리가족 여름 상비약 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 미란(젖무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동창(연 상처) 벌레물린데, 두드러기

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

50mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물 이카리딘케어



[특·장점]

모기와 털진드기에 2.5시간 기피효과로 아웃도어 활동에 필수품목!
생후 6개월부터 버물케어하세요!

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

이카리딘(별규) 7.0g

[효능·효과]

모기, 털진드기의 기피제

[용법·용량]

- 1) 모기 기피제로 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다.
- 2) 털 진드기 기피제로 사용시, 피부에 똑바로 세워 고루 분무한다.

[포장단위] 60mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타



[특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제 - 의약품 플라스타 제형
옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!
해외여행 갈 때, 아웃도어 활동 시 포켓에 쏙~!

[원료약품 및 그 분량] 1매 중

디펜히드라민(KP) 0.493mg

이소프로핀메틸페놀(별규) 0.493mg

L-멘톨(KP) 1.478mg

[효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 동창(연 상처)

[용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질한부위)에 붙인다.

[포장단위] 42매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타 MINI



[특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제-의약품플라스타 제형
옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!
해외여행 갈 때, 아웃도어 활동시 포켓에 쏙~!

[원료약품 및 그 분량] 1매 중

디펜히드라민(KP)	0.493mg
이소프로핀메틸페놀(별규)	0.493mg
L-멘톨(KP)	1.478mg

[효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 동창(언 상처)

[용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

[포장단위] 48매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 물파스에프



[특·장점]

물파스의 원조 토끼표 물파스

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	7g
L-멘톨(KP)	7g
클로르페니라민말레산염(KP)	0.1g
토코페롤아세테이트(KP)	0.1g
글리시레틴산(BP)	0.05g

[효능·효과]

다음 증상의 소염·진통 : 뱀, 타박상, 근육통, 요통, 어깨결림, 신경통, 류마티스 통증

[용법·용량]

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 88mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 에어파스맥스



[특·장점]

빠른 소염·진통작용 분사력·청량감 강화, 사용이 간편한 원터치 캡

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

L-멘톨(KP)	5.02g
dl-캄파(KP)	4.71g
살라실산메틸(KP)	2.75g
디펜히드라민(KP)	0.063g

[효능·효과]

벤데, 멍든데, 타박상, 근육통 치료의 보조

[용법·용량]

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 200mL

[저장방법] 기밀용기, 화기를 피하여 냉소에 보관

솔루록센 연질캡슐



[특·장점] 액상형의 강력한 진통소염제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

나프록센	250mg
------	-------

[효능·효과]

류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건(힘줄)염, 급성통풍, 월경곤란증

다음 질환에도 사용할 수 있음 : 활액낭염, 골근격장애(염좌(뺨), 좌상, 외상, 요천통), 수술 후 동통(통증), 편두통, 발치후 동통(통증)

[용법·용량]

- 1) 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염
성인 : 나프록센으로서 1회 250~500mg 1일 2회(12시간마다) 경구 투여한다.
- 2) 급성통풍
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구투여하고 발작이 소실(사라짐)될 때까지 8시간 간격으로 250mg을 경구투여한다.
- 3) 골격근장애, 수술후 동통(통증), 발치 후 동통(통증), 월경곤란증, 건(힘줄)염, 활액낭염
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 500mg을 경구투여한 후 6~8시간 간격으로 250mg씩 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다.
- 4) 편두통
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구 투여한다.
필요하면 1일 250~500mg을 더 투여할 수 있으며 초회량(처음 복용량)의 투여 30분 후에 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 10캡슐 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

시노카엔 캡슐



[특·장점]

코감기 전문 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

벨라돈나총알카로이드(별규) 0.13mg
(히오스시아민으로서 0.1235mg)
클로르페니라민말레산염(KP) 4mg
페닐레프린염산염(KP) 3.33mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호
동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과]

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍 통증), 머리 무거움

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

슬루샷쿨 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 종합감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,280mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg
구아이페네신(KP) 41.6mg
슈도에페드린염산염(USP) 15.0mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) 8.0mg
클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg
dl-메틸에페드린염산염(KP) 6.25mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

솔루샷코프 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 목감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,190mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg
 구아이페네신(KP) 41.6mg
 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) 8.0mg
 di-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg
 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

솔루샷노즈 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 코감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,190mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg
 슈도에페드린염산염(USP) 15.0mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg
 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

솔루펜 / 솔루펜 무색소



[특·장점]

강력한 진통효과, 신속한 효과발현, 위장장애 개선
액상타입의 빠른효과

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

덱사부프로펜(별규) 300mg

[효능·효과]

급성 및 만성 관절염(만성 다발성 관절염, 류마티스성 관절염 등), 관절증, 염증성 류마티스 질환(강직성 척추염, 근육 류마티즘), 외상 및 수술후 통증성 부종 또는 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3~4회 식사시 경구투여

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시노코프캡슐



[특·장점]

디프로필린 처방의 기침감기 전문치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

디프로필린(USP) 37.5mg
dl-메틸에페드린염산염(KP) 3.1mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) 10mg
디펜히드라민염산염(KP) 7.5mg
첨가제(타르색소) : 유당(소의 젖), 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과]

기침, 가래

[용법·용량]

연령(나이)에 따라 다음 용량을 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

만 15세 이상 : 1회 2캡슐

만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1 캡슐(단, 만 11세 이상~만 15세 미만은 1일 4회 복용한다.)

만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1캡슐

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

한생액 보틀형



[특·장점]

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설폰산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	10mg

[효능·효과] 기침, 가래, 천식

[용법·용량]

성인 1회 : 8mL/ 소아 1회 : 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고, 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[포장단위] 75mL [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

한생액 파우치형



[특·장점]

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설폰산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	10mg

[효능·효과] 기침, 가래, 천식

[용법·용량]

성인 1회 : 8mL/ 소아 1회 : 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고, 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[포장단위] 8mL x 10포 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

스토마신캡슐



[특·장점]

구풍해독탕 배합, 생약성분의 항염증제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

구풍해독탕건조엑스(별규)	685mg
방풍(KP)	500mg
우방자(KP)	500mg
연교(KP)	835mg
형개(KP)	250mg
강활(KP)	250mg
감초(KP)	250mg
길경(KP)	500mg
석고(생규)	1665mg

동물유래성분 : 유당(젖소의 우유)

[효능·효과]

인후(목구멍)가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

[용법·용량]

보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7~14세 성인 용량의 2/3(4/3캡슐), 4~6세 성인 용량의 1/2(1캡슐), 2~3세 성인용량의 1/3(2/3캡슐), 1세 이하 성인용량의 1/4(1/2캡슐)을 1일 3회 식전 또는 식간에 미지근한 물에 녹여서 입이나 목 등을 적셔가면서 소량씩 천천히 복용한다.(캡슐로 삼키지 말 것)

[포장단위] 10캡슐 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

슬루아펜 연질캡슐



[특·장점]

액상형 해열 진통제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

아세트아미노펜	325mg
---------	-------

[효능·효과]

감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뻥 통증) 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)

[용법·용량]

만 12세 이상 소아 및 성인

1회 2캡슐씩 1일 3~4회 (4~6시간마다) 필요시 복용한다.

1일 최대 4그램 (12캡슐)을 초과하여 복용하지 않는다.

이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용한다.

[포장단위]

20캡슐

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

에키나포스프로텍트정



[특·장점]

유럽에서 온 천연성분의 면역 증강제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

에키나세아푸르푸레아근틴크 60mg
에키나세아푸르푸레아허바틴크 1140mg

[효능·효과]

기침, 콧물, 인후염, 두통, 발열, 근육통과 같은 일반적인 감기 증상의 치료

[용법·용량]

성인 (12세 이상)
1일 2~3회, 1회 1정씩
식전에 물과 함께 복용하거나 입안에서 녹여서 복용한다.

[포장단위] 10정, 120정(60정 x 2EA)

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

댄스탑 외용액



[특·장점]

비듬, 지루피부염, 어루러기

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

케토코나졸(USP) 2g
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

[효능·효과]

효모균(Pityrosporum)에 의한 다음의 피부질환: 비듬, 지루피부염, 어루러기

[용법·용량]

감염부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분간 적용한 후 행구어 낸다.

[포장단위] 100mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

누보클렌액



[특·장점]

살균, 소독, 상처치료에 유효한 복합성분

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

클로르헥시딘글루콘산염(EP)	1.0mL
(글루콘산클로르헥시딘으로서 0.2g)	
디펜히드라민염(USP)	0.3g
디부카인염(USP)	0.1g
나파졸린염(약전)	0.1g
알란토인(USP)	0.2g

[효능·효과]

긁힌 상처, 베인 상처, 창상, 손과 손가락의 살균, 소독, 치질인 경우의 항문 살균 소독

[용법·용량]

1일 1회~수회 적당량을 환부에 바른다.

[포장단위] 50mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

나프젠액



[특·장점]

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱무좀까지 허가

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

나프티핀염산염(USP)	1.0g
--------------	------

[효능·효과]

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증
- 3) 어루러기
- 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증 : 1일 1 회 환부를 깨끗이 닦고, 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

나프젠크림



[특·장점]

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱무좀까지 허가

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

나프티핀염산염(USP) 10mg

[효능·효과]

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증 : 1일 1 회 환부를 깨끗이 닦고, 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

디에클렌



[특·장점]

여드름엔 손대지 말고 뿌리세요~~
뿌리는 복합 여드름 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

알란토인 2mg
에탄올 228.4mg
살리실산 5mg

[효능·효과]

여드름 치료제

[용법·용량]

1일 2회(아침, 저녁), 적량을 환부에 분사하여 바른다.

[포장단위] 100mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

디나펜 플라스타



[특·장점]

붙이는 관절염 치료제. 먹는 디클로페낙나트륨을 간편하게
외상 후 부기제거에 효과적인 단하나의 NSAID
24시간 지속효과

[원료약품 및 그 분량] 약 1매(70cm², 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) 15mg

[효능·효과]

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 힘줄 및 힘줄윤활막염 4) 힘줄주위염
- 5) 위팔뼈상과염(테니스엘보 등)
- 6) 근육통(근, 근막성요(허리)통증 등)
- 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

[용법·용량]

성인(15세이상) : 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙입니다.
단, 15세 미만은 사용하지 않습니다.

[포장단위] 10매

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하보관

통에존 쿨 플라스타



[특·장점]

관절 깊숙이 더 빠르게

[원료약품 및 그 분량] 1매 중

펠비낙(BP) 35mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상온골상과염(테니스엘보우 등) 5) 근육통
- 6) 외상후의 종창·동통

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

[포장단위] 10매

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하보관

플로스탑 플라스타



[특·장점]

관절 깊은 곳의 통증까지 더 빠르고 시원하게

[원료약품 및 그 분량] 1매(10cm) 중

플루르비프로펜(KP) 2.8571mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상온골상과염(테니스엘보우 등) 5)근육통
- 6) 외상후의 종창·동통

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

[포장단위] 10매

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하보관

케프로텍 플라스타



[특·장점]

빠르고 시원한 관절염 근육통 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1매(10cm) 중

케토프로펜(KP) 4.2857mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상온골상과염(테니스엘보우 등) 5)근육통
- 6) 외상후의 종창·동통

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

[포장단위] 10매

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하보관

오큐바이트 프리저비전



[특·장점]

세계판매 1위! AREDS연구로 임상효과 입증, 눈 전문 고단위 항산화제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

50% 초산토코페롤 200mg(비타민E로서 100 IU)
 베타카로틴 10% 42.960mg(베타카로틴으로서 7.160 IU)
 아스트코르빈산 90% 125.556mg
 (아스트코르빈산으로서 113mg)
 산화제이동 0.501mg(구리로서 0.4mg)
 산화아연 21.658mg(아연으로서 17.4mg)

[효능·효과]

눈의 건조함 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 갱년기시 다음증상의 완화 :
 어께, 목 결림, 수족저림, 수족냉증


[용법·용량]

1일 1회 1정을 복용하거나, 의사의 지시에 따라 복용한다.

[포장단위] 120T

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

루핑점안액 1회용



[특·장점]

히알루론산 첨가 국내최초 OTC 인공누액

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

염화나트륨(JP) 7.4mg
 염화칼륨(JP) 1.3mg
 히프로멜로오스(JP) 2mg

[효능·효과]

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조)
 하드콘텍트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불편감
 눈의 침침함(눈곱이 많을 때) 등

[용법·용량]

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다.

[포장단위] 30EA, 36EA

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

케라네일캡슐



[특·장점]

손톱의 발육부진, 국내 최초 손톱영양제 컨셉의 의약품
손톱무좀 치료제와 병용 사용시 빠른 효과
24시간 지속효과

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

약용호모(별규) 100mg
케라틴(별규) 20mg
(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg)
티아민질산염(KP) 60mg
판토텐산칼슘(KP) 60mg
L-시스틴(KP) 20mg
p-아미노벤조산(USP) 20mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 황색203호, 청색 1호
첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

[포장단위] 63C x 2EA [저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하 보관

리버 350



[특·장점]

실리마린 고함량 간질환 치료제
카르두스마리아누스엑스 350mg(국내 최고함량)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규) 350mg
(실리마린으로서 196mg)
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

[효능·효과]

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[포장단위] 120C (60C x 2EA)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

칼로바이



[특·장점]

녹차추출물 : 항산화작용·체지방 감소효과·혈중콜레스테롤 개선에 도움
알로에전잎 : 배변활동 원활에 도움

비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지, 철의 흡수, 유해산소로부터 세포 보호에 필요

판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요

아연 : 정상적인 면역기능, 정상적인 세포분열에 필요

셀레늄 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요

[원료약품 및 그 분량] 1포 중

알로에베라추출물 [(알로에베라추출물 분말, 말토덱스트린), 멕시코산], 녹차 추출물(인도산), 비타민 C, 건조효모(셀렌, 캐나다산), 산화아연, 판토텐산칼슘, 결정셀룰로스, 말토덱스트린, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 스테아린산 마그네슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 흰강낭콩 추출물분말, 키토산분말, 사프란추출물분말, L-카르니틴, 울금추출농축액분말, 아미노산혼합제제(L-라이신염산염, L-트레오닌, L-로이신, L-발린, L-메티오닌, L-페닐알라닌, L-이소로이신, L-트립토판, 프락토올리고당) 대두, 새우 함유

[용법·용량]

1일 2회, 1회 1포(4정)를 물과 함께 섭취하십시오.

[포장단위] 120포

[저장방법] 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

헤모라민 필름형트로키



[특·장점]

간편하게 물없이 녹여 먹는 빈혈치료제
복약순응도 GOOD! 휴대가 간편하며 흡수가 빠릅니다.

[원료약품 및 그 분량] 1장 (112mg) 중

폴리말토오스수산화제이철착염(KP) 50mg (철로서 14mg)

폴산(KP) 150μg

[효능·효과]

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량]

1일 2회, 1회 1장을 씹거나 삼키지 말고 입안에서 천천히 녹여 복용한다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위]

4매 x 20EA

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

헤파멜즈로라엑



[특·장점]

독일 오리지널 LOLA(L-Omitine-L-Aspartate) 3,000mg 함유
간해독 작용과 간세포 회복의 Dual-action
만성피로와 집중력 저하 개선

[원료약품 및 그 분량] 1병(30mL) 중

L-아스파르트산-L-오르니틴(DAB) 3g

[효능·효과]

다음의 중증 간질환 해독의 보조치료 : 간경변, 만성간염

[용법·용량]

1. 만성간염 : 심한 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1회 3g, 1일 1~2회 식후에 복용한다.
2. 간경변 : 가벼운 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 6g, 1일 2회 많은 양의 물에 녹여 식후에 복용한다.

[포장단위]

30mL x 100BTL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

더마화이트



[특·장점]

트라넥삼산을 함유한 신개념 기미전용 치료제
기존 기미치료성분인 엘시스테인, 비타민C, 판토텐산칼슘에 강력한 미백 성분인 트라넥삼산과 피리독신을 추가

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

트라넥삼산(KP) 125mg
제피아스코르브산(별규) 53mg
(아스코르브산으로 50mg)
엘시스테인(JP) 40mg
판토텐산칼슘(KP) 4mg
피리독신염산염(KP) 1mg
동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과] 기미

[용법·용량]

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후 복용, 15세 미만은 복용하지 마십시오.
용법/용량은 엄수하여 주시기 바랍니다.

[포장단위] 180정 x 2EA

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

안티비오



[특·장점]

위산에 강하고 항생제 내성이 있는 정장제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

락토바실러스아시도필루스균 75mg

[효능·효과]

정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내 이상발효

[용법·용량]

1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 락토바실러스아시도필루스균으로서 1회 용량 (생균수로서 1×10^8 개)을 1일 1~3회 복용한다.
2. 6세 이상~12세 미만의 소아 : 이 약으로서 1회 용량 (생균수로서 1×10^8 개)을 1일 1~2회 복용한다.
3. 2세 이상~6세 미만의 소아 : 성인 용량의 1/3포 (생균수로서 0.33×10^8 개)을 1일 1~3회 복용한다.
4. 1세 이상~2세 미만의 소아 : 성인 용량의 1/5포 (생균수로서 0.2×10^8)를 1일 1~3회 복용한다.
5. 3개월 이상~1세 미만의 영아 : 성인 용량의 1/10포 (생균수로서 0.1×10^8)를 1일 1~3회 복용한다.

[포장단위] 10포

[저장방법] 기밀용기, 실온($1 \sim 30^\circ\text{C}$) 보관

수퍼바이옴프로



[특·장점]

맛있게 씹어먹는 츄어블 유산균

한국인 장에 존재하는 특허 비피더스균

[원료약품 및 그 분량] 1일 섭취량 2정(1.6g) 당

프로바이오틱스균수 20억마리

비피더스균 56%(비피도박테리움 비피덤, 비피도박테리움 애니멀리스 락티스)

유산균 44%(엔테로코커스 페숨, 락토바실러스 람노서스, 락토바실러스 플란타룸락토바실러스 헬베티쿠스)

아연 6mg

[효능·효과]

프로바이오틱스

① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음

② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음

아연

① 정상적인 면역기능에 필요

② 정상적인 세포분열에 필요

[용법·용량]

1일 1회, 1회 2정 식후에 씹어서 섭취

[포장단위] 60정

[저장방법] 직사광선을 피해 실온 보관

바로테스트 센스



[특·장점]

Whole hCG 검출법을 적용한 High Quality 제품
불량을 0%에 도전하는 고품질 임신 진단시약

[원료약품 및 그 분량] 1테스트 중

마우스 항 hCG 단일클론항체1 (체외진단용) 0.15±0.03μg
마우스 항 hCG 단일클론항체2 (체외진단용) 0.8±0.16μg
항 마우스 면역글로불린지 (체외진단용) 1.0±0.2μg

[효능·효과]

노종의 hCG(Human Chorionic Gonadotropin)검사를 통한 임신의 진단

[용법·용량]

생리예정일 7일 이후에 검사 실시

[포장단위]

1키트

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

바로체크



[특·장점]

바로바로 체크할 수 있는 진단키트
장영실상 수상 作, 현대약품 바로체크

[원료약품 및 그 분량] 1키트 중

검사선 1 마우스 유래 항 - HCG
검사선 2 HCG
대조선 C 염소유래 항 - Chicken IgY
측합패드 금 - 마우스 유래항 - HCG 접합체
측합패드 금 - Chicken IgY

[효능·효과]

노종의 hCG(Human Chorionic Gonadotropin)검사를 통한 임신의 진단

[용법·용량]

생리예정일 7일 이후에 검사 실시

[포장단위]

1키트

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

라니아정



[특·장점]

사후피임약 No.1 노레보의 현대약품이 만든 순한 피임약
에스트로겐 함량 최저, 오심, 구토, 복부 팽만감 등 부작용 최소화
2세대 피임약의 혈전생성을 최저

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

레보노르게스트렐(EP) 0.1mg
에티닐에스트라디올(EP) 0.02mg
첨가제(타르색소) : 알루미늄 AC 알루미늄레이크
인디고카르민 알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당(소의 우유)
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

[효능·효과]

피임, 이약을 복용할 수 있는 여성의 중등도의 여드름 치료

[용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.
매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.
(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오)

[포장단위] 21정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

보니타정



[특·장점]

머시론 1st 제네릭 제품(최초, 유일)
에스트로겐 함량 최저
3세대 피임약으로 부종, 다모, 우울감 등 최소화

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

데소게스트렐(별규) 0.15mg
에티닐에스트라디올(별규) 0.02mg
첨가제(타르색소) : 알루미늄 AC 알루미늄레이크
인디고카르민 알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

[효능·효과]

피임

[용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.
매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.
(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오)

[포장단위] 21정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

현대 아시클로버 크림



[특·장점]

구순포진, 생식기포진, 각종 바이러스 질환에 현대약품 아시클로버

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

아시클로버(BP) 50mg

[효능·효과]

단순포진 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진과 구순포진 포함)

[용법·용량]

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
2. 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

[포장단위]

5g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

면역히어로



[특·장점]

아연을 함유한 건강기능식품

[원료약품 및 그 분량]

글루콘산아연, 정제수, 아가베시럽(멕시코산), 블루베리농축액(미국산), 라즈베리농축액(대만산), 딸기농축액(딸기농축액(국산), 이소말토올리고당), 사탕벌꿀, 아사이베리과즙분말, 크랜베리농축분말, 배농축액, 엘더베리추출분말, 포도향{프로필렌글리콜, 합성향료(포도향키베이스, 믹스베리향키베이스, 에틸말톨, 머스캣향키베이스), 초산}, 비타민C, 복합황금추출물, 프락토올리고당, 잔탄검, 글루코만난, 치커리식이섬유

[효능·효과]

정상적인 면역기능에 필요

정상적인 세포분열에 필요

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물에 희석하여 섭취하십시오.

[포장단위]

300mL (10mL x 30포)

[저장방법]

직사광선을 피해 실온 보관

수퍼이문젤리



[특·장점]

정상적인 면역기능에 필요한 건강기능식품

[원료약품 및 그 분량]

글루콘산아연, 정제수, 결정과당, 프락토올리고당, 아가베시럽, 엘더베리농축액, 아로니아농축액, 검베이스혼합제분말(로커스트콩검, 잔탄검, 한천, 타마린드검), 구연산, 구연산삼나트륨, 효소처리스테비아, 아로니아향(합성향료), 수크랄로스(감미료), 히알루론산, 황금혼합추출물

[효능·효과]

정상적인 면역기능에 필요
정상적인 세포분열에 필요

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오.

[포장단위]

400g (20g x 20포)

[저장방법]

직사광선을 피해 실온 보관

쾌변화이바젤리



[특·장점]

상쾌한 장변화, 원활한 배변활동

[원료약품 및 그 분량]

난소화성말토덱스트린[외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 정제수, 결정과당, 청포도농축액(칠레산), 프락토올리고당, 아가베시럽, 검베이스혼합제분말(로커스트콩검, 잔탄검, 한천, 타마린드검), 치커리뿌리추출물분말(네델란드산), 구연산, 청포도향(합성향료), 구연산삼나트륨, 사과농축액(국산), 수크랄로스(감미료), 당근농축액분말, 토마토추출물분말, 생선콜라겐, 치자그린색소(치자황색소, 치자청색소), 황금혼합추출물, 녹차추출물분말, 히알루론산혼합제(덱스트린, 히알루론산) 토마토 함유

[효능·효과]

난소화성말토덱스트린 제품으로 원활한 배변활동에 도움을 줄 수 있음

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오.

[포장단위]

400g (20g x 20포)

[저장방법]

직사광선을 피해 실온 보관

햇살담은 비타D젤리



[특·장점]

비타민D를 함유한 건강기능식품

[원료약품 및 그 분량]

(1포 20g 당) 비타민D3혼합제(비타민D 0.25% 함유, 자당, 아라비아검, 옥수수전분, 중쇄중성지방오일, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 정제수, 프락토올리고당, 칼라만시농축액(칼라만시추출물, 사양벌꿀), 망고농축액, 자일리톨, 오렌지농축액, 로커스트콩검분말(로커스트콩검, 잔탄검, 포도당, 한천, 타미린드검), 구연산삼나트륨, 젯산칼슘, 오렌지향1(합성향료), 구연산, 오렌지향2, 카라기난혼합제(카라기난, 염화칼륨), 효소처리스테비아

[효능·효과]

칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요

뼈의 형성과 유지에 필요

골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오.

[포장단위]

400g (20g x 20포)

[저장방법]

직사광선을 피해 실온 보관

얼라이브



[특·장점] 75가지 영양성분이 한 알에! 짙 채운 종합 비타민

[원료약품 및 그 분량]

비타민C, 판토텐산칼슘, 피리독신염산염, 비타민B1질산염, 니코틴아미드, 푸마르산제일철, 비타민B2-D-α-토코페롤에시드호박산, 비타민B12, 산화아연, 황산망간, 비타민K1, 몰리브덴산나트륨, 비타민D3, 베타카로틴, 황산동, 요오드칼륨, 셀렌산나트륨, 레티닐아세트산염, 염화크롬, 엽산, 비오틴, 탄산칼슘, 결정셀룰로스, 산화마그네슘, 스테아린산, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 황색코팅기제(히드록시프로필메틸셀룰로스, 폴리덱스트로스, 이산화티타늄(착색료), 비타민B2, 말크, 말도덱스트린, 판유), 투명코팅기제(히드록시프로필메틸셀룰로스, 글리세린), 이산화규소(고결방지제), 주석산수소칼륨, 그린푸드분말(스피루리나, 보리싹, 서양 민들레 어린잎, 밀싹, 레몬밤잎, 레몬그라스잎, 서양잎, 클로렐라), 혼합 야채분말(파슬리, 케일, 시금치, 밀싹, 브루셀스프라우트, 아스파라거스, 브로콜리, 꽃양배추, 비트, 당근, 양배추, 마늘), 버섯분말(영지버섯, 느타리버섯, 표고버섯, 잎새버섯, 노루궁뎅이버섯, 아가리쿠스자실체, 구름버섯, 차가버섯, 자령), 허브분말(가시오갈피, 병풀, 인삼), 과일혼합분말(아시아베리, 자두, 크랜베리, 블루베리, 딸기, 블랙베리, 빌베리, 체리, 살구, 오렌지, 파인애플), 스테아린산마그네슘, 이노시톨, 루틴, 포도주스분말, 소화효소분말(브로멜라인, 리파아제), 마리골드꽃추출물, 홍경천추출물

[효능·효과]

결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요. 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌

[용법·용량] 1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오.

[포장단위] 120포 [저장방법] 직사광선을 피해 실온 보관

트랜스이엑스겔



[특·장점]

고품질 수용성 윤활 젤리 겔타입
질내 건조증을 가진 여성분들에게 적합한 윤활제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

글리세린(KP) 170mg

[효능·효과]

직장온도계, 탐폰, 기타기구(관장기, 관주기, 카테타 등)의 체강내 삽입시의 윤활제, 질내윤활제

[용법·용량]

적용부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

100g

[저장방법]

실온 보관, 기밀용기, 3년

블리스텍스 센시티브



[특·장점]

코코아버터와 시어버터 추출물 함유
민감한 입술에 저자극성 보습효과

[전성분]

페트롤라툼, 카카오씨드버터, 하이드록시스테아릭애씨드, 쉐어버터, 페녹시에탄올

[효능·효과]

민감한 입술에 저자극성의 보습 효과와 편안함 제공

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

4.25g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 딥 리뉴얼



[특·장점]

코엔자임큐텐, 히알루론산 함유로 건강한 입술유지
탁월한 보습효과

[전성분]

호호바에스터, 캐스터씨유, 다이메티콘, 비즈왁스, 민트오일,
마이크로크리스탈린왁스

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

3.7g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밑면 표기)

블리스텍스 체리향



[특·장점]

풍부한 보습을 돕는 Shea버터 성분 함유로 보습효과 및 입술보호
가장 인기많은 달콤한 체리향의 크림타입 제형 립밤

[전성분]

정제수, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비즈왁스, 펩트롤라툼, 에칠
핵실메톡시신나메이트, 향료, 폴리글리세릴-3다이아아이스테아레이트,
솔비탄아이스테아레이트, 하이드로제네이티드소이폴리글리세라이드
C 15-23알케인, 글리세린, 폴리솔베이트60, 세틸알코올스테아릴베네
이트, 다이메티콘, 페녹시에탄올, 하이드레이티드실리카, 아라키딜알코올,
베헤닐알코올, 아라키딜글루코사이드, 라놀린알코올, Shea버터, 솔비탄올
리베이트, 소듐하이드록사이드, 알란토인, 미리스틱애씨드, 팔미틱애씨드,
올레익애씨드, 라우릭애씨드, 포스포릭애씨드소듐사카린, 시트릭애씨드,
칼슘다이소듐이디티에이

[효능·효과]

수분공급을 통한 보습 및 입술 보호

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

6mL

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밑면 표기)

블리스텍스 릴리프 립크림



[특·장점]

튼 입술 보호와 수분공급을 통한 재생 효과
탁월한 치료효과, 탁월한 흡수력과 지속력
자외선 차단효과

[전성분]

알란토일, 옥시벤존, 페디메이트, 비즈왁스, 라놀린, 미네랄오일,
육계나무잎 추출물, 페퍼민트오일

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

6mL

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 립 바이브런스



[특·장점]

입술의 톤을 살려주는 아름다운 색조와 펄의 조화
강력한 고보습 제품

[전성분]

다이메티콘, 옥시벤존, 옥티녹세이트, 향료, 미네랄오일,
마이크로크리스탈린왁스, 아주까리씨유, 포도씨유

[효능·효과]

강력한 보습효과로 민감한 입술의 보호

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.


[포장단위]

3.69g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 립 메덱스



[특·장점]

풍부한 보습 역할을 돕는 유칼립투스잎 오일, 클로브꽃 오일 등의 성분 함유

[전성분]

캠퍼, 멘톨, 페트롤라툼

[효능·효과]

보습, 향, 입술탄력, 입술보호, 입술진정

[용법·용량]

적용부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 준다.

[사용 시 주의사항]

어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 6세 이하 어린이가 사용 시에는 의사에게 문의하세요.

본 제품에 이상이 있을 경우에는 공정거래위원회 분쟁해결 기준에 의해 보상해드립니다.

[포장단위]

7g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

마이실 빠른 허브 헤어칼라 1호(자연흑갈색)



[특·장점]

옷 타지 않는 천연 염색약

특허성분과 10가지 식물성 오일 함유로 촉촉하고, 부드럽게!

[원료약품 및 그 분량] 1pack 중

염모제 효능성분

- 1제 : 피로갈롤 - 2제 : 황산철수화물

염모제 전성분

- 1제 : 정제수, 우레아, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 피로갈롤, 스테아릴 스테아레이트, 세테스-20, 소듐설파이트, 암모늄바이카보네이트, 에탄올아민, 스테아트라이모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 양민 뿌리추출물, 꽃양배추추출물, 당아욱잎추출물, 아이슬란드이끼 추출물, 하이드롤라이즈드케라틴, 동백나무씨오일, 마카다미아씨 오일, 로즈힙열매오일, 스위트아몬드오일, 아보카도오일, 올리브 오일, 코코넛야자오일, 호호바씨오일, 복숭아씨오일, 코튼씨오일
- 2제 : 정제수, 페러스설파이트, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 세테스-20, 베헤닐알코올, 세테스-15, 세트리모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 로그우드목부추출물

[효능·효과] 모발의 염모(자연흑갈색)

[용법·용량] 사용 시의 주의사항은 첨부문서를 참조하십시오.

[내용물] 1제 50g × 2, 2제 50g × 2, 비닐가운, 비닐장갑, 염색봇/빗, 도포용기, 사용설명서

마이실 빠른 허브 헤어칼라 2호(연한흑갈색)



[특·장점]

옷 타지 않은 천연 염색약
빠른 염색 효과, 현대약품 마이실허브!

[원료약품 및 그 분량] 1pack 중

염모제 효능성분

- 1제 : 피로갈롤
- 2제 : 황산철수화물

염모제 전성분

- 1제 : 정제수, 우레아, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 스테아릴스테아레이트, 세테스-20, 피로갈롤, 소듐셀파이트, 암모늄바이카보네이트, 에탄올아민, 스테아트라이모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 암빈뿌리추출물, 꽃양배추추출물, 당아욱잎추출물, 아이슬란드이끼추출물, 하이드롤라이즈드케라틴, 동백나무씨오일, 마카다미아씨오일, 로즈힙열매오일, 스위트아몬드오일, 아보카도오일, 올리브오일, 코코넛야자오일, 호호바씨오일, 복숭아씨오일, 코튼씨오일
- 2제 : 정제수, 페러스설페이트, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 세테스-20, 베헤닐알코올, 세테스-15, 세트리모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 로그우드목부추출물

[효능·효과]

모발의 염모(연한흑갈색)

[용법·용량]

사용 시의 주의사항은 첨부문서를 참조하십시오.

[내용물]

1제 50g × 2, 2제 50g × 2, 비닐가운, 비닐장갑, 염색붓/빗,
도포용기, 사용설명서

폼포미하이드로패치 스팟밴드



[특·장점]

얼굴 작은 부위도 티나지 않게! 폼포미하이드로패치 스팟밴드(원형)

[전성분]

하이드로콜로이드점착테이프H, 플라스틱필름-100

[효능·효과]

상처 부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호
센텔라아시아티카 + 알로에베라 함유
두가지 크기로 티나지 않게

[용법·용량]

환부에 1일 1회~수회 1매씩 갈아 붙인다.

[포장단위]

57매 (10mm 45매 / 12mm 12매) : 원형 10mm x 15매 x 3매, 12mm x 12매 x 1매

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

폼포미하이드로패치 프리컷밴드



[특·장점]

상처 부위엔 폼포미하이드로패치 프리컷밴드(잘라쓰는형)

[전성분]

하이드로콜로이드점착테이프H, 종이필름

[효능·효과]

상처 부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호
센텔라아시아티카 + 알로에베라 함유
두가지 크기로 상처부위에 맞게

[용법·용량]

환부에 1일 1회~수회 1매씩 갈아 붙인다.

[포장단위]

4매 (50mm 3매 / 100mm 1매) : 소형 50mm x 100mm x 3매, 100mm x 100mm매 x 1매

[저장방법]


기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

1 국내 제약업계 최초로 CCM 재 인증

- 지난 2008년 “소비자중심경영(Consumer Centered Management : 이하 CCM)”을 도입, 소비자불만을 사전에 예방하고 신속하게 사후구제를 처리할 수 있는 내부실행체계를 구축하여 소비자만족에 앞장서 왔던 현대약품(주)은 2008년 제약업계 최초 CCM인증에 이어 2018년에 5차 재인증을 받음으로 명실상부히 소비자 신뢰를 얻는 회사로서의 이미지를 굳건히 하였습니다.

2 현대약품(주) CCM의 특징

현대약품(주) CCM(소비자 중심 경영 프로그램)은 소비자에게 불만이나 피해가 발생할 경우 현대약품(주) 내부에서 신속, 정확하게 소비자 문제를 해결하고 이를 소비자와 소통하는 것을 목표로 설정하여 이를 시행하고 있습니다.



3 CCM 인증서

- 제약업계 최초 CCM 우수기업 2018년 5차 재인증 (2018년 12월)
CCM(소비자중심경영 프로그램) 우수기업 인증 (공정거래 위원회)



[현대약품 강남본사]

서울특별시 강남구 봉은사로 135, 현대약품빌딩
1666-9979

[현대약품 중부지점]

서울특별시 광진구 능동로 247, 유원빌딩 4층
02-3662-2411

[현대약품 서부지점]

서울특별시 강서구 양천로 588, 3층
02-3662-2411

[현대약품 동부지점]

경기도 군포시 고산로 148길 17, 군포IT밸리 B동 1901호
031-8086-7191

[현대약품 충청지점]

대전광역시 중구 계룡로 786, 사학연금회관 504호
042-541-6672

[현대약품 광주지점]

광주광역시 광산구 하남대로 148, 2층
062-951-6672

[현대약품 부산지점]

부산광역시 금정구 중앙대로 1925, 금정타워 7층
051-516-7342

[현대약품 대구지점]

대구광역시 수성구 들안로 149, 3층
053-761-9305