

복합 마이녹실 5%



[특·장점]

유해산소로부터 피부를 보호하는 항산화작용의 토코페롤, 급만성/지루성 습진, 접촉성 피부염에 효과가 있는 피리독신을 복합 적용

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

미녹시딜(USP)	50mg
피리독신염산염(KP)	0.5mg
토코페롤아세테이트(KP)	0.8mg
L-멘톨(KP)	3mg

[효능·효과]

남성용 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 240mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실 5%



[특·장점]

전국 14개 대학병원임상(170명)
대한피부과학회 (2009;47(3):295~302)
높은 치료효과 확인 92.9% 모발개수 및 굵기 증가

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP)	5.0g
-----------------	------

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 315mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실플러스 5% 쿨타입



[특·장점]

L-멘톨 함유로 끈적임이 적고 시원한 프리미엄급 탈모증 치료제
PG 미함유, 보습제 맥스판테놀 함유

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중
미녹시딜(USP) 5.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 180mL, 360mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실 3%



[특·장점]

5%에 비해 부작용이 감소되어 예민한 여성의 두피에 맞춤형 제품
PG 미함유로 두피 트러블 최소화

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중
미녹시딜(USP) 3.0g
덱스판테놀(USP) 1.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 남성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질한부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질한부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 90mL, 180mL(리필용)

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실 S 캡슐



[특·장점]

남녀공용 비호르몬 성분의 먹는 탈모증치료제 “1일 3회, 1회 1캡슐 복용”

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

케라틴(별규)	20mg
(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg)	
약용효모(별규)	100mg
질산치아민(KP)	60mg
판토텐산칼슘(KP)	60mg
L-시스틴(KP)	20mg
파라아미노벤조산(USP)	20mg

[효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

[포장단위] 90C, 120C, 180C, 360C

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실겔 5%



[특·장점]

국내 최초 흐르지 않는 겔 타입, 마사지가 가능한 미니 둥근머리
휴대가 간편하여 여행시 편리!

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

미녹시딜(USP)	50mg
-----------	------

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5g~1g을 1일 2회 (아침, 저녁),
최소 4개월동안 환부에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2g을 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g, 90g

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실겔 3%



[특·장점]

손댈 필요없이 두피에 직접 바르세요. 흐르지 않아 위생적인 젤 타입
휴대가 간편하여 여행시 편리!

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

미녹시딜(USP) 30mg

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

남성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5g~1g을 1일 2회
(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.

2) 1일 총투여량이 2g을 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

여성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5g을 1일 2회(아침,
저녁), 최소 4개월동안 환부(질환부위)에만 바른다.

2) 1일 총투여량이 1.3g을 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

덱스녹실정



[특·장점]

덱스판테놀 단일제제로서 효과가 입증된 탈모 보조 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

덱스판테놀(USP) 100mg

[효능·효과]

탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1정을 1일 3회 복용한다.

치료기간은 6주이다.

[포장단위]

120정, 360정

[저장방법]

기밀용기, 25℃ 이하 보관

둥근머리 버물리겔



[특·장점]

흐르지 않고 흡수가 빠른 겔타입 제형!
마사지 기능의 둥근머리 용기, 벌레물려 가려울땐 - 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

dl-캄파(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
L-멘톨(KP)	3g
디부카인염산염(KP)	0.3g
디펜히드라민염산염(KP)	2g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 동창, 벌레물린데, 두드러기

[용법·용량]

1일 1~수회 환부(질한 부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위] 40g, 50g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

둥근머리 버물리키드크림



[특·장점]

연약한 피부의 유아와 여성을 위한 저자극 크림타입 제형
생후 1개월 이상 사용가능

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

디펜히드라민(KP)	10mg
덱스판테놀(USP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	10mg
글리시리진산이칼륨(KP)	5mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	1mg
파라옥시벤조산프로필	1mg

[효능·효과]

가려움, 피부염, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레물림, 찰과상

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 25g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리알파액



[특·장점]

벌레물려 가려울때 뿌리는 버물리 알파액

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

덱스판테놀(USP)	10mg
디부카인염산염(KP)	5mg
dl-캄파(KP)	30mg
L-멘톨(KP)	30mg
디펜히드라민염산염(KP)	20mg
에녹솔론(BP)	2mg

[효능·효과]

습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창 (언 상처)

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

70mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리에스액 스펀지타입



[특·장점]

벌레물림시장 No.1 브랜드 버물리!

30개월 이상부터 사용할 수 있어요~

오랜시간 사랑받은 우리가족 여름상비약!

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 수회 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위]

50mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리에스액 솔타입



[특·장점]

가려울때 긁어주는 편리한 솔타입
LDPE 특수재질로 부드럽고 위생적
벌레물려 가려울땐- 버물리, 우리가족 여름 상비약 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 찰라, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 수회 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위] 50mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타



[특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제 - 의약품 플라스타 제형
옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!
해외여행 갈 때, 아웃도어 활동 시 포켓에 쏙~!

[원료약품 및 그 분량] 1매 중

디펜히드라민(KP)	0.493mg
이소프로핀메틸페놀(별규)	0.493mg
L-멘톨(KP)	1.478mg

[효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 동창(언 상처)

[용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

[포장단위] 42매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타 MINI



[특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제-의약품플라스타 제형
옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!
해외여행 갈 때, 아웃도어 활동시 포켓에 쏙~!

[원료약품 및 그 분량] 1매 중

디펜히드라민(KP) 0.493mg
이소프로핀메틸페놀(벌규) 0.493mg
L-멘톨(KP) 1.478mg

[효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 동창(언 상처)

[용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

[포장단위]

48매

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물 이카리딘케어



[특·장점]

모기와 털진드기에 2.5시간 기피효과로 아웃도어 활동에 필수품목!
생후 6개월부터 버물케어하세요!

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

이카리딘(벌규) 7.0g

[효능·효과]

모기, 털진드기의 기피제

[용법·용량]

약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위
및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.

[포장단위]

60mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

페스트가드 플러스액



[특·장점]

이카리딘 15% 함유로 모기, 털진드기 외 살인진드기(작은소참진드기) 기피제, 뿌리는 모기장!

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

이카리딘(별규) 15g
첨가제 : 정제수, 글리세린, 에탄올(99.5), 폴리소르베이트80, 시트르산, 시트르산나트륨

[효능·효과]

모기, 진드기(털진드기, 작은소참진드기 포함)의 기피

[용법·용량]

약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.

[포장단위]

60mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 물파스에프



[특·장점]

물파스의 원조 토끼표 물파스

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

살리실산메틸(KP) 3g
dl-캄파(KP) 8g
L-멘톨(KP) 7g
클로르페니라민말레산염(KP) 0.1g
토코페롤아세테이트(KP) 0.1g
에녹솔론(BP) 0.05g

[효능·효과]

- 다음 증상의 소염 · 진통 : 뱀, 타박상, 근육통, 요통, 어깨결림, 신경통, 류마티스통증
- 동창

[용법·용량]

1일 1~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

45mL, 88mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 에어파스맥스

**[특·장점]**

빠른 소염·진통작용 분사력·청량감 강화, 사용이 간편한 원터치 캡

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

L-멘톨(KP)	5.02g
dl-캄파(KP)	4.71g
살라실산메틸(KP)	2.75g
디펜히드라민(KP)	0.063g

[효능·효과]

베타데, 멍든데, 타박상, 근육통 치료의 보조

[용법·용량]

1일 1회 ~ 수회 환부에 적당량을 분무한다.

[포장단위] 200mL

[저장방법] 기밀용기, 직사광선을 피해 실온의 건조한 곳에 보관

솔루록센 연질캡슐

**[특·장점]** 액상형의 강력한 진통소염제**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중

나프록센(KP)	250mg
----------	-------

[효능·효과]

류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건(힘줄)염, 급성통풍, 월경곤란증

다음 질환에도 사용할 수 있음 : 활액낭염, 골근격장애(염좌(뺨)), 좌상, 외상, 요천통, 수술 후 동통(통증), 편두통, 발치후 동통(통증)

[용법·용량]

- 1) 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염
성인 : 나프록센으로서 1회 250~500mg 1일 2회(12시간마다) 경구 투여한다.
- 2) 급성통풍
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구투여하고 발작이 소실(사라짐)될 때까지 8시간 간격으로 250mg을 경구투여한다.
- 3) 골격근장애, 수술후 동통(통증), 발치 후 동통(통증), 월경곤란증, 건(힘줄)염, 활액낭염
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 500mg을 경구투여한 후 6~8시간 간격으로 250mg씩 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다.
- 4) 편두통
성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구 투여한다.
필요하면 1일 250~500mg을 더 투여할 수 있으며 초회량(처음 복용량)의 투여 30분 후에 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 10캡슐 **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

시노카엔 캡슐



[특·장점]

코감기 전문 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

벨라돈나총알카로이드(별규) 0.13mg
(히오스시아민으로서 0.1235mg)

클로르페니라민말레산염(KP) 4mg

페닐레프린염산염(KP) 3.33mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호

동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과]

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍 통증), 머리 무거움

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

솔루샷쿨 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 종합감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,280mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg

guaifenesin(KP) 41.6mg

슈도에페드린염산염(USP) 15.0mg

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) 8.0mg

클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg

dl-메틸에페드린염산염(KP) 6.25mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

솔루샷코프 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 목감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,190mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg
 구아이페네신(KP) 41.6mg
 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) ... 8.0mg
 dl-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg
 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

솔루샷노즈 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 코감기약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,190mg) 중

아세트아미노펜(KP) 200.0mg
 슈도에페드린염산염(USP) 15.0mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg
 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호

[효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

솔루펜 / 솔루펜 무색소



[특·장점]

강력한 진통효과, 신속한 효과발현, 위장장애 개선
액상타입의 빠른효과

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

덱시부프로펜(별규) 300mg

[효능·효과]

1. 만성 다발성 관절염, 류마티스관절염
2. 관절증
3. 강직척추염
4. 외상 및 수술 후 통증성 부종 또는 염증
5. 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

[용법·용량]

성인 : 덱시부프로펜으로서 1회 300mg을 1일 2~4회 경구투여한다.
단, 1일 덱시부프로펜으로서 1,200mg을 초과하지 않는다.

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시노코프 캡슐



[특·장점]

디프로필린 처방의 기침감기 전문치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

디프로필린(USP) 37.5mg
dl-메틸에페드린염산염(KP) 3.1mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) ... 10mg
디펜히드라민염산염(KP) 7.5mg
첨가제(타르색소) : 유당(소의 젖), 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과]

기침, 가래

[용법·용량]

연령(나이)에 따라 다음 용량을 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.
만 15세 이상 : 1회 2캡슐
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1캡슐과 1/3캡슐 (4/3 캡슐)
만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1캡슐

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

한생액 보틀형



【특·장점】

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설폰산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필 10mg	

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

【용법·용량】

성인 1회 : 8mL / 소아 1회 - 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL
만 2세 미만에게는 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고, 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】 75mL 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

한생액 파우치형



【특·장점】

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설폰산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필 10mg	

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

【용법·용량】

성인 1회 : 8mL / 소아 1회 - 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL
만 2세 미만에게는 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고, 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】 8mL x 6포 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

스토마신 캡슐



[특·장점]

구풍해독탕 배합, 생약성분의 항염증제

[원료약품 및 그 분량]

구풍해독탕건조엑스(별규)	685mg
방풍(KP)	500mg
우방자(KP)	500mg
연교(KP)	835mg
형개(KP)	250mg
강활(KP)	250mg
감초(KP)	250mg
길경(KP)	500mg
석고(생규)	1,665mg

동물유래성분 : 유당(젖소의 우유)

[효능·효과]

인후(목구멍)가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

[용법·용량]

보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7~14세 성인 용량의 2/3(4/3캡슐), 4~6세 성인 용량의 1/2(1캡슐), 2~3세 성인용량의 1/3(2/3캡슐), 1세 이하 성인용량의 1/4(1/2캡슐)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 미지근한 물에 녹여서 입이나 목 등을 적셔가면서 소량씩 천천히 복용한다.(캡슐로 삼키지 말 것)

[포장단위] 10캡슐 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

에키나포스프로텍트정



[특·장점]

유럽에서 온 천연성분의 면역 증강제

[원료약품 및 그 분량]

에키나시아푸르푸레아 뿌리팅크(별규)	60mg
에키나시아푸르푸레아 허바팅크(별규)	1,140mg

[효능·효과]

기침, 콧물, 인후염, 두통, 발열, 근육통과 같은 일반적인 감기 증상의 치료

[용법·용량]

성인 (12세 이상)
1일 2~3회, 1회 1정씩
식전에 물과 함께 복용하거나 입안에서 녹여서 복용한다.

[포장단위] 60정(10정 x 6EA), 200정(10정 x 20EA)

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

댄스탑 외용액



[특·장점]

비듬, 지루피부염, 어루러기

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

케토코나졸(USP) 2g

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

[효능·효과]

효모균(Pityrosporum)에 의한 다음의 피부질환 : 비듬, 지루피부염, 어루러기

[용법·용량]

감염부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분간 적용한 후 행구어 낸다.

[포장단위] 100mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

누보클렌액



[특·장점]

살균, 소독, 상처치료에 유효한 복합성분

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

클로르헥시딘글루콘산염액(EP) 1.0mL

(글루콘산클로르헥시딘으로서 0.2g)

디펜히드라민염산염(USP) 0.3g

디부카인염산염(USP) 0.1g

나파졸린염산염(USP) 0.1g

알란토인(USP) 0.2g

[효능·효과]

긁힌 상처, 베인 상처, 창상, 손과 손가락의 살균, 소독, 치질인 경우의 항문 살균 소독

[용법·용량]

1일 1회~수회 적당량을 환부에 바른다.

[포장단위] 50mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

나프젠액



[특·장점]

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱무좀까지 허가

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

나프티핀염산염(USP) 1.0g

[효능·효과]

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증 : 1일 1회(가능하면 취침시) 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱) 진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

나프젠크림



[특·장점]

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱무좀까지 허가

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

나프티핀염산염(USP) 10mg

[효능·효과]

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증 : 1일 1회(가능하면 취침시) 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱) 진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

풋원겔



[특·장점]

복합성분으로 효과빠른 겔타입 무좀치료제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

테르비나핀염산염(JP)	10mg
리도카인(KP)	20mg
에녹솔론(EP)	1mg
디펜히드라민염산염(KP)	10mg
이소프로필메틸페놀(별규)	10mg
기타 첨가제 : 디이소프로판올아민, 에탄올, 정제수, 카보머940, 체리블라섬 HP-AE38101, 폴리옥실40·경화피마자유, 프로필렌글리콜	

[효능·효과]

무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법·용량]

1일 1회 적당량을 환부(질한부위)에 도포한다.

[포장단위]

15g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

메타지 크림



[특·장점]

광범위 피부질환 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

베타메타손발레레이트(KP)	0.61mg
겐타마이신황산염(KP)	1mg(억가)
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg, 파라옥시벤조산프로필 1mg	
기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 백색바셀린, 세탄올, 소르비탄스테아레이트 정제수, 팔미트산세틸, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜	

[효능·효과]

- 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환: 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진, 박탈피부염, 가려움, 건선
- 1도 화상

[용법·용량]

1일 1~3회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

35g/튜브

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

이바프텐액



[특·장점]

가글형 구내염, 인두염 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

벤지다민염산염(KP) 22.5mg
기타 첨가제 : 토코페롤폴리에틸렌글리콜숙시네이트,인산일수소칼륨,
D-소르비톨액,박하유,시트르산,L-멘톨,정제수,파라옥시벤조산메틸

[효능·효과]

치은염, 구내염, 아구창, 발치전·후, 인두염, 편도염, 방사선요법 및 삼관법
등의 물리적 원인에 의한 구강점막염

[용법·용량]

1회 15mL 1일 2~3회 원액 그대로 또는 소량의 물로 희석하여 양치질한다.
의사의 지도감독없이 7일 이상 연속투여하지 않는다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 15mL x 10포

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

시로제노



[특·장점]

Neosol 공법으로 효과빠른 알레르기 증상완화제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

세티리진염산염(BP) 10mg
첨가제 : 프로필렌글리콜, 숙신산젤라틴, 청색1호, 포비돈, 폴리에틸렌
글리콜400, 정제수, 에틸바닐린, 부분탈수유동소르비톨, 적색3호, 수산화칼륨

[효능·효과]

계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원
인불명의) 두드러기, 피부 소양증(가려움증)

[용법·용량]

1. 성인 및 6세 이상의 소아 : 세티리진염산염으로서 1일 1회 10mg을 취침
전에 경구투여한다(복용한다).
2. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 투여한다.
3. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

시노타딘



[특·장점]

Neosol 공법으로 효과 빠른 알레르기 증상완화제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

로라타딘(USP) 10mg
첨가제 : 청색1호, 젤라틴, 폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 부분탈수유동
소르비톨, 폴리소르베이트80, 글리세린모노카프릴로카프레이트, 적색40호

[효능·효과]

1. 알레르기성 비염 증상(재채기, 콧물, 가려움, 눈의 작열감)의 일시적인 완화
2. 만성 특발성 두드러기 증상 완화

[용법·용량]

1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg을 경구투여한다.
2. 6~12세 미만의 소아
- 체중 30kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg 투여한다.

[포장단위] 10캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

디나펜 플라스타



[특·장점]

붙이는 관절염 치료제. 먹는 디클로페낙나트륨을 간편하게
외상 후 부기제거에 효과적인 단하나의 NSAID
24시간 지속효과

[원료약품 및 그 분량] 약 1매(70cm², 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) 15mg

[효능·효과]

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 힘줄 및 힘줄윤활막염 4) 힘줄주위염
- 5) 위팔뼈상과염(테니스엘보 등)
- 6) 근육통(근, 근막성요(허리)통증 등)
- 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

[용법·용량]

성인(15세 이상) : 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙인다.
단, 15세 미만은 사용하지 않습니다.

[포장단위] 10매, 40매

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

케프로텍카타플라스마



[특·장점]

케토프로펜 50.14mg의 국내 최대 함량 습식 첩부제

[원료약품 및 그 분량] 1매(9cm×13cm 11.7g 중)

케토프로펜(KP) 50.14mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창·동통

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 환부에 1일 2회 부착한다.

[포장단위]

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

플루펜



[특·장점]

비스테로이드성 소염진통제 '플루르비프로펜'을 함유한 첩부제

[원료약품 및 그 분량] 1매(8×12cm, 6.9그램) 중

플루르비프로펜(KP) 27.4mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) :

퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염(힘줄윤활막염), 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상 후의 종창(부기)·동통(통증)

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1일 2회 환부(질환부위) 부착한다.

[포장단위]

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

오큐바이트 프리저비전정



[특·장점]

세계판매 1위! AREDS연구로 임상효과 입증, 눈 전문 고단위 항산화제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

토코페롤아세테이트 2배산(KP)	200mg
(비타민E로서 100 IU)	
β-카로틴 10%(별규)	42.960mg
(β-카로틴으로서 4.296mg)	
아스코르브산 과립 90%(별규)	125.556mg
(아스코르브산으로서 113mg)	
산화제이구리(KP)	0.501mg
(구리로서 0.4mg)	
산화아연(USP)	21.658mg
(아연으로서 17.4mg)	

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, C, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민A : 눈의 건조감의 완화, 야맹증 - 비타민E : 말초혈행장애 및 갱년기시 증상의 완화(어깨, 목결림, 수족저림, 수족냉증)

2. 아연의 보급

[용법·용량] 성인 : 1일 1회 1~2정을 복용한다.

[포장단위] 120정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

루핑점안액 1회용



[특·장점]

히알루론산 첨가 국내최초 OTC 인공누액

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

염화나트륨(JP)	7.4mg
염화칼륨(JP)	1.3mg
히프로멜로오스(JP)	2mg

[효능·효과]

눈의 피로, 누액의 보조(눈의 건조), 하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용시 불편감, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

[용법·용량]

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다.

[포장단위] 30EA, 36EA

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

리버 350



[특·장점]

실리마린 고향량 간질환 치료제
카르두스마리아누스엑스 350mg(국내 최고함량)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규) 350mg

(실리마린으로서 196mg)

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

[효능·효과]

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[포장단위]

120C(60C x 2EA)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

벤포엑티브 연질캡슐



[특·장점]

비타민 E, B1, B2, B6 액상형 비타민 영양제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

벤포티아민(KP) 100mg

(티아민염산염으로서 72.3mg)

리보플라빈(KP) 50mg

니코틴산아미드(KP) 50mg

피리독신염산염(USP) 50mg

토코페롤아세테이트(KP) 100mg

감마-오리자놀(KP) 5mg

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6 의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 각기, 눈의피로

[용법·용량]

만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[포장단위]

120C(10C x 12EA)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

벤포엑티브 프리미엄정



[특·장점]

국내최대 고함량 벤포티아민 300mg 함유한 비타민 영양제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

벤포티아민(KP) 300mg
피리독신염산염(KP) 100mg

[효능·효과]

비타민 B1 및 B6 결핍으로 인한 신경계 질환

[용법·용량]

성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[포장단위]

120정(60정 x 2EA)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

유린타민 캡슐



[특·장점]

전립선 비대증과 배뇨작용에 도움이 되는 3가지 성분의 복합 전립선 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

글리신(KP) 45mg
L-알라닌(USP) 100mg
L-글루탐산(BP) 265mg

[효능·효과]

전립선비대에 의한 배뇨곤란·잔뇨 및 잔뇨감·빈뇨

[용법·용량]

성인 1회 2캡슐씩, 1일 3회 복용한다.

[포장단위]

360C(180C x 2EA)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

더마하이트



[특·장점]

트라넥삼산을 함유한 신개념 기미전용 치료제
기존 기미치료성분인 엘시스테인, 비타민C, 판토텐산칼슘에 강력한 미백
성분인 트라넥삼산과 피리독신을 추가

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

트라넥삼산(KP) 125mg
제피아스코르브산(별규) 53mg
(아스코르브산으로 50mg)
엘시스테인(JP) 40mg
판토텐산칼슘(KP) 4mg
피리독신염산염(KP) 1mg
동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[효능·효과] 기미

[용법·용량]

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후 복용, 15세 미만은 복용하지 마십시오.
용법/용량은 엄수하여 주시기 바랍니다.

[포장단위] 180정 x 2EA

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

속시탈정



[특·장점]

소화효소와 위장관 운동조절제가 함유된 복합성분 위장질환 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

메타규산알루미늄산마그네슘(KP) 40mg
탄산수소나트륨(KP) 50mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(별규) 20mg
스코폴리아엑스(KP) 5mg
리파제(별규) 7.5mg
감초가루(생규) 25mg
침강탄산칼슘(KP) 100mg
트리메부틴말레산염(KP) 50mg

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림,
소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용한다.

[포장단위] 10정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

센스락유 연질캡슐



[특·장점]

효과빠른 액상형 변비약

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

비사코딜(KP)	6mg
우르소데옥시콜산(JP)	12mg
도큐세이트나트륨(USP)	20mg

[효능·효과]

- 변비

- 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내 이상발효, 치질

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1회 1캡슐씩 1일 2회 한도로 하여 되도록이면 공복시에 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[포장단위]

20C (10C x 2EA)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

바로테스트 센스



[특·장점]

Whole hCG 검출법을 적용한 High Quality 제품

불량을 0%에 도전하는고품질 임신 진단시약

[원료약품 및 그 분량] 1테스트 중

마우스 항 hCG 단일클론항체1 (체외진단용)	0.15±0.03μg
마우스 항 hCG 단일클론항체2 (체외진단용)	0.8±0.16μg
항 마우스 면역글로불린지 (체외진단용)	1.0±0.2μg

[효능·효과]

뇨중의 hCG(Human Chorionic Gonadotropin)검사를 통한 임신의 진단

[용법·용량]

생리예정일 7일 이후에 검사 실시

[포장단위]

1키트

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

라니아정



[특·장점]

사후피임약 No.1 노레보의 현대약품이 만든 순한 피임약
에스트로겐 함량 최저, 오심, 구토, 복부 팽만감 등 부작용 최소화
2세대 피임약의 혈전생성을 최저

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

레보노르게스트렐(EP) 0.1mg
에티닐에스트라디올(EP) 0.02mg
첨가제(타르색소) : 알루미늄라레드 AC 알루미늄레이크
인디고카르민 알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당(소의 우유)
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

[효능·효과]

피임, 이약을 복용할 수 있는 여성의 중등도의 여드름 치료

[용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.
매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.
(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

[포장단위] 21정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

보니타정



[특·장점]

머시론 1st 제네릭 제품(최초, 유일)
에스트로겐 함량 최저
3세대 피임약으로 부종, 다모, 우울감 등 최소화

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

데소게스트렐(별규) 0.15mg
에티닐에스트라디올(별규) 0.02mg
첨가제(타르색소) : 알루미늄라레드 AC 알루미늄레이크
인디고카르민 알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

[효능·효과]

피임

[용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.
매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.
(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

[포장단위] 21정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 아시클로버 크림



[특·장점]

구순포진, 생식기포진, 각종 바이러스 질환에 현대약품 아시클로버

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

아시클로버(BP) 50mg

[효능·효과]

단순포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순(입술)포진(물집) 포함)

[용법·용량]

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
2. 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

[포장단위]

5g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

스펙타민 프리미엄



[특·장점]

수험생을 위한 영양성분 집합체로 한번에 복용!

청소년 건강지킴이 스펙타민 프리미엄정

[원료약품 및 그 분량] 1포 중

L-테아닌 200mg
 옥타코사놀 100mg
 루테인 20mg
 진세노사이드의 합 3mg
 비타민B1 1.2mg, 비타민B2 1.4mg, 비타민B6 1.5mg, 나이아신 15mg,
 판토텐산 5mg, 비오틴 30mcg, 비타민A 700mcg, 비타민D 5mcg,
 아연 8.5mg

[효능·효과]

테아닌 : 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음
 옥타코사놀 : 지구력증진에 도움을 줄 수 있음
 마린콜드꽃추출물 : 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
 비타민 B군 : 체내 에너지 생성
 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질대사와 에너지 생성에 필요

[용법·용량] 1일 1회, 1회 1포

[포장단위] 30포

[저장방법] 직사광선을 피해 실온 보관

트랜스이엑스겔



[특·장점]

고품질 수용성 윤활 젤리 겔타입
질내 건조증을 가진 여성분들에게 적합한 윤활제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

글리세린(KP) 170mg

[효능·효과]

직장온도계, 탐폰, 기타기구(관장기, 관주기, 카테타 등)의 체강내 삽입시의 윤활제, 질내윤활제

[용법·용량]

적용부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

100g

[저장방법]

실온 보관, 기밀용기, 3년

블리스텍스 센시티브



[특·장점]

코코아버터와 시어버터 추출물 함유
민감한 입술에 저자극성 보습효과

[전성분]

페트롤라툼, 카카오씨드버터, 하이드록시스테아릭에씨드, 쉐어버터, 페녹시에탄올

[효능·효과]

민감한 입술에 저자극성의 보습 효과와 편안함 제공

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

4.25g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밑면 표기)

블리스텍스 딥 리뉴얼



[특·장점]

코엔자임큐텐, 히알루론산 함유로 건강한 입술유지
탁월한 보습효과

[전성분]

호호바에스터, 캐스터씨유, 다이메티콘, 비즈왁스, 민트오일,
마이크로크리스탈린왁스

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

3.7g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 릴리프 립크림



[특·장점]

튼 입술 보호와 수분공급을 통한 재생 효과
탁월한 치료효과, 탁월한 흡수력과 지속력
자외선 차단효과

[전성분]

알란토일, 옥시벤존, 페디메이트, 비즈왁스, 라놀린, 미네랄오일,
육계나무잎 추출물, 페퍼민트오일

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

6mL

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 립 바이브런스

**[특·장점]**

입술의 톤을 살려주는 아름다운 색조와 펄의 조화
강력한 고보습 제품

[전성분]

다이메티콘, 옥시벤존, 옥티녹세이트, 향료, 미네랄오일,
마이크로크리스탈린왁스, 아주까리씨유, 포도씨유

[효능·효과]

강력한 보습효과로 민감한 입술의 보호

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

3.69g

[저장방법]

제조일로부터 3년(제조일자 제품일면 표기)

폼포미하이드로패치 스팟밴드

**[특·장점]**

얼굴 작은 부위도 티나지 않게! 폼포미하이드로패치 스팟밴드(원형)

[전성분]

하이드로콜로이드점착테이프H, 플라스틱필름-100

[효능·효과]

상처 부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

[용법·용량]

환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 붙인다.

[포장단위]

10mm x 23매

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

폼포미하이드로패치 프리컷밴드



[특·장점]

상처 부위엔 폼포미하이드로패치 프리컷밴드(잘라쓰는형)

[전성분]

하이드로콜로이드점착테이프, 종이필름

[효능·효과]

상처 부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

[용법·용량]

환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 붙인다.

[포장단위]

4매 (50mm 3매 / 100mm 1매) : 소형 50mm x 100mm x 3매,
100mm x 100mm매 x 1매

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

마이실 빠른 허브 헤어칼라 1호(자연흑갈색)



[특·장점]

옷 타지 않는 천연 염색약

특허성분과 10가지 식물성 오일 함유로 촉촉하고, 부드럽게!

[원료약품 및 그 분량] 1pack 중

염모제 효능성분 - 1제: 피로갈롤 - 2제: 황산철수화물

염모제 전성분

- 1제: 정제수, 우레아, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 피로갈롤, 스테아릴스테아레이트, 세테스-20, 소듐실파이트, 암모늄바이카보네이트, 에탄올아민, 스테아트라이모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 암빈뿌리추출물, 꽃양배추추출물, 당아욱잎추출물, 아이슬란드이끼추출물, 하이드롤라이즈드케라틴, 동백나무씨오일, 마카다미아씨오일, 로즈힙열매오일, 스위트아몬드오일, 아보카도오일, 올리브오일, 코코넛야자오일, 호호바씨오일, 복숭아씨오일, 코튼씨오일
- 2제: 정제수, 페르스설페이트, 세테아릴알코올, 미네랄오일, 세테스-20, 베헤닐알코올, 세테스-15, 세트리모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 로그우드목부추출물

[효능·효과] 모발의 염모(자연흑갈색)

[용법·용량] 사용 시의 주의사항은 첨부문서를 참조하십시오.

[내용물]


1제 50g x 2, 2제 50g x 2, 비닐가운, 비닐장갑, 염색붓/빗,
도포용기, 사용설명서

1 국내 제약업계 최초로 CCM 재 인증

- 지난 2008년 “소비자중심경영(Consumer Centered Management : 이하 CCM)”을 도입, 소비자불만을 사전에 예방하고 신속하게 사후구제를 처리할 수 있는 내부실행체계를 구축하여 소비자만족에 앞장서 왔던 현대약품(주)은 2008년 제약업계 최초 CCM인증에 이어 '11년 재인증을 받음으로써 명실상부히 소비자 신뢰를 얻는 회사로서의 이미지를 굳건히 하였습니다.




2 현대약품(주) CCM의 특징

- 현대약품(주) CCM(소비자 중심 경영 프로그램)은 소비자에게 불만이나 피해가 발생할 경우 현대약품(주) 내부에서 신속, 정확하게 소비자 문제를 해결하고 이를 소비자와 소통하는 것을 목표로 설정하여 이를 시행하고 있습니다.



3 CCM 인증서

- 2020 올해의 CCM 우수상 획득 (공정거래위원장 표창)
CCM 제 6차 재인증 획득 ('21년 1월)



메모



메모





[현대약품 강남본사]

서울특별시 강남구 봉은사로 135, 현대약품빌딩
1666-9979

[현대약품 중부지점]

서울특별시 광진구 능동로 247, 유원빌딩 4층
02-3662-2411

[현대약품 서부지점]

서울특별시 강서구 양천로 588, 3층
02-3662-2411

[현대약품 동부지점]

경기도 군포시 고산로 148길 17, 군포IT밸리 B동 1901호
031-8086-7191

[현대약품 충청지점]

대전광역시 중구 계룡로 786, 사학연금회관 504호
042-541-6672

[현대약품 광주지점]

광주광역시 광산구 하남대로 148, 2층
062-951-6672

[현대약품 부산지점]

부산광역시 금정구 중앙대로 1925, 금정타워 7층
051-516-7342

[현대약품 대구지점]

대구광역시 수성구 들안로 149, 3층
053-761-9305