

PRODUCT INDEX

HYUNDAI PHARM

탈모 시리즈

마이녹실 폼 에어로솔 5%
마이녹실액 5%
마이녹실액 3%
마이녹실 겔 5%
마이녹실 S 캡슐
덱스녹실정

버물리 시리즈

버물리 에스액
버물리 에스액 (솔타입)
버물리 알파액
등근머리 버물리 에스액
버물리 키드크림
버물리 플라스타 42매
버물리 플라스타 48매(MINI)

기피제 시리즈

버물 이카리딘케어액
페스트가드 플러스액

피임약

라니아정

안과용제

루핑 점안액(30본, 36본)

소염·진통제

솔루펜 연질캡슐(청색/무색)
솔루록센 연질캡슐
현대 물파스에프

해열·진통·감기

시노카엔 플러스 연질캡슐
시노플루콜드 연질캡슐

알러지완화제

시로제노 연질캡슐
시노타딘 연질캡슐

위장관질환

속시탈정

전립선

유린타민 캡슐

영양제

리버 350 연질캡슐
헤파멜즈산
현대아라미정
현대아라비정

항균제 · 항바이러스제

현대 아시클로버 크림

외피용제

메타지 크림
나프젠액
나프젠크림
댄스탑 외용액
바디드란트액
누보클렌액

첨부제 시리즈

케프로텍 카타플라스마(5매)
플루펜 카타플라스마(5매)
케프로텍 플라스타(40매)
디나펜 플라스타(40매)

의약외품

현대 에어파스맥스
블리스텍스 센시티브
블리스텍스 딥 리뉴얼
블리스텍스 립 릴리프 크림
블리스텍스 립 바이브런스
폼포미 뉴 하이드로패치(잘라쓰는 타입)
폼포미 플러스 아쿠아 밴드(표준형)
폼포미 플러스 아쿠아 밴드(혼합형)
마이실 빠른 허브 헤어칼라 1호(진한흑색)
미에로 화이바 100

마이녹실 폼 에어로솔 5%



박하향 첨가로 청량한 사용감과 편리함
흘러내림과 끈적임이 적어 빠르게 흡수됨

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

미녹시딜(USP) 4.75g
(원액 중 미녹시딜 5%)

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

1) 남성

- 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 1g(이 약 뚜껑의 반정도에 해당)을 1일 2회(아침, 저녁), 최소 2~4개월 동안, 환부(질한 부위)에만 바른다.
- 1일 총 투여량이 2g을 초과하지 않는다.

2) 여성

- 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 1g(이 약 뚜껑의 반정도에 해당)을 1일 1회, 최소 3~6개월 동안, 환부(질한 부위)에만 바른다.
- 1일 총 투여량이 1g을 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실액 5%



14개 대학병원 임상시험 성공(서울대, 연세대 등)
대한민국 유일 임상시험 완료된 탈모치료제
소용량 60mL부터 대용량 360mL까지 다양한 용량 보유
PG(프로필렌글리콜)미함유로 두피 트러블 부작용 최소화

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) 5.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 150mL, 360mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실액 3%



국내 최초 미녹시딜 3% 허가 제품
5%에 비해 부작용이 감소되어 예민한 여성의 두피에
맞춤형 제품. PG 미함유로 두피 트러블 최소화
17개 대학병원 임상시험 성공(고려대 등)

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) 3.0g

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

- 남성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안 환부(질한부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안 환부(질한부위)에만 바른다.
2) 1일 총투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.


[포장단위] 60mL, 180mL

임상자료 1 - 남성형 탈모증환자

품목 : 마이녹실 3%


국내 최초 미녹시딜 3% 임상 시험 진행(대학 병원 17개 및 종합병원 피부과)

382명의 대규모 임상 시험으로 16주 도포 환자 76.7% 개선으로 임상적으로 호전된 것을 알 수 있음



제목	탈모증 환자에서 Minoxidil 국소도포제의 치료효과
주관	대한피부과학회, 현대약품
참가	전국 17개 대학병원 및 종합병원 피부과
기간	1985년 10월 ~ 1986년 3월 (6개월간)
대상환자	(총 382명) 1) 남자 (333명), 여자 (49명) 2) 남성형 탈모증 (298명), 원형탈모증 (84명)

Ref.) 탈모증 환자에서 Minoxidil 국소 도포제의 치료효과, 이민걸 외 17인, 대학피부과학회지: 제24권 제 2호 1986년, 1986;24(2):186




임상자료 2

품목 : 마이녹실 5%

미녹시딜 5% 임상 시험 진행(전국 14개 대학병원 피부과에서 진행, 서울대, 연세대, 고려대 등)

치료 24주 후 158명(92.9%)에서 임상적으로 호전이 나타난 것을 알 수 있음



제목	남성형탈모증 환자에 대한 5% Minoxidil외용액의 공개 다기관 임상연구
주관	대한모발학회, 현대약품
참가	전국 14개 대학병원피부과(서울대, 연세대, 고려대 등)
기간	2007년 5월 ~ 2008년 7월 (15개월간)
대상환자	총 170명



Ref.) 2009년 실시, 출처 : 남성형 탈모증 환자에 대한 5% 미녹시딜 외용액의 공개 다기관 임상연구 (제 4상 임상시험)(대한모발학회 공동연구).

이원수 대한피부과학회지 : 제 47권 제 3호 2009년, 2009;47(3):296

마이녹실 겔 5%



국내 유일 겔타입
관적임 최소화로 아침에도 부담없이 사용 가능
피부 투과력 향상시켜주는 히드록시프로필 베타덱스첨가

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

미녹시딜(USP) 50mg

[효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

[용법·용량]

1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5g~1g을 1일 2회 (아침, 저녁),
최소 4개월동안 환부에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2g을 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

마이녹실 S 캡슐



비호르몬 성분의 탈모증 치료제로 성기능 장애 등 체내
호르몬 대사 관련 부작용이 없음
간편한 복용으로 탈모로 고민하는 남성과 여성 모두 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

케라틴(별규) 20mg

(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로
이신 2.70mg)

약용효모(별규) 100mg

티아민질산염(KP) 60mg

판토텐산칼슘(KP) 60mg

L-시스틴(KP) 20mg

p-아미노벤조산(USP) 20mg

[효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

[포장단위] 180C, 360C [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

덱스녹실정



효과가 입증된 덱스판테놀 성분의 의약품
판토텐산 유도체, 모발 영양 공급문제로 인해 발생하는
후지기 탈모에 도움을 줌
힘없는 모근 강화 및 상처 치유, 염증 완화, 보습효과

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

덱스판테놀(USP) 100mg

[효능·효과]

탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1정을 1일 3회 복용한다.

치료기간은 6주이다.

[포장단위]

120정

[저장방법]

기밀용기, 25℃ 이하 보관

버물리 에스액



Detail Point

벌레 물림 시장 마켓 셰어 1위 브랜드 버물리
31개월 이상부터 사용할 수 있어요~
오랜시간 사랑받은 우리가족 여름상비약!

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 찰진, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

50mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 에스액 (솔타입)



Detail Point

약국 소매 전용 제품 버물리 에스액(솔타입)
솔 타입 제형으로 솔솔 긁어 시원한 느낌으로!
LDPE 특수 재질로 부드럽고 위생적

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
L-멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dl-캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

[효능·효과]

습진, 피부염, 찰진, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

50mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 알파액



Detail Point

스프레이 타입으로 위생적으로 사용가능
70mL로 대용량으로 회사, 학교 등에서 사용하기 용이
국소 마취제 역할인 디부카인염산염 성분이
국내 최대 함량으로 가려움증 완화에 효과적

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

덱스판테놀(USP)	10mg
디부카인염산염(KP)	5mg
dl-캄파(KP)	30mg
L-멘톨(KP)	30mg
디펜히드라민염산염(KP)	20mg
에녹솔론(BP)	2mg

[효능·효과]

습진, 피부염, 찰진, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위]

70mL

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

동근머리 버물리 에스겔



디펜히드라민염산염, 크로타미톤, 리도카인 성분 함유로
통증과 가려움 완화시간이 빠름
손을 사용하지 않고 사용할 수 있는 동근 머리 용기

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

디펜히드라민염산염(USP)	20mg
크로타미톤(USP)	50mg
에녹솔론(BP)	2mg
리도카인(KP)	20mg
DL-카파(KP)	30mg
L-멘톨(JP)	30mg

[효능·효과]

습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창

[용법·용량]

1일 1~수회 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위] 35g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 키드크림



연약한 피부의 유아와 여성을 위한 저자극 크림 타입 제형
생후 1개월 유아부터 사용 가능
때 밀림 현상이 적어 사용하기 편리

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

디펜히드라민(KP)	10mg
덱스판테놀(USP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	10mg
글리시리진산이칼륨(KP)	5mg

[효능·효과]

가려움, 피부염, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레물림, 짓무름


[용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 25g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타 42매



몸에 붙여 쓰는 제품으로 아이들이 굽지 않아 좋음
지름 2.8cm로 큰 범위에도 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 1매(원지름 28mm 6.157cm, 134.61mg) 중

디펜히드라민(KP)	0.493mg
이소프로필메틸페놀(별규)	0.493mg
L-멘톨(KP)	1.478mg

[효능·효과]

벌레물림, 가려움, 동창(언 상처)

[용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

[포장단위] 42매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리 플라스타 48매 (MINI)



Detail Point

몸에 붙여 쓰는 제품으로 아이들이 긁지 않아 좋음
지름 2cm로 좁은 부위에도 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 1매(원지름 20mm 3.142cm, 68.68mg) 중
디펜히드라민(KP) 0.252mg
이소프로필메틸페놀(별규) 0.252mg
L-멘톨(KP) 0.754mg

[효능·효과]
벌레물린데, 가려움, 동창(연 상처)

[용법·용량]
1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

[포장단위] 48매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물 이카리딘케어액



Detail Point

모기와 털진드기에 2~3시간 **기피효과**로
아웃도어 활동에 **필수!**
생후 6개월부터 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 100g 중
이카리딘(별규) 7.0g

[효능·효과]
모기, 털진드기의 기피제

[용법·용량]
약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위
및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.

[포장단위] 60mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

페스트가드 플러스액



Detail Point

모기와 털진드기, 작은소참진드기에 4~5시간
기피 효과로 캠핑, 여행에 **필수!**
생후 6개월부터 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 100g 중
이카리딘(별규) 15g

[효능·효과]
모기, 진드기(털진드기, 작은소참진드기 포함)의 기피

[용법·용량]
약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위
및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.

[포장단위] 60mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

라니아정



에티닐에스트라디올 함량이 국내 최저로 부작용 최소화
여성의 중증도 여드름 치료 효능
사후피임약 업계 1위로 노레보정, 엘라원정을
판매하는 믿을 수 있는 회사

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

레보노르게스트렐(EP) 0.1mg

에티닐에스트라디올(EP) 0.02mg

[효능·효과]

피임, 이 약을 복용할 수 있는 여성의 중증도의 여드름 치료

[용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.

매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.

(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

[포장단위] 21정/PTP

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

루핑 점안액 (30본, 36본)



30본

36본



히알루론산나트륨이 함유된 OTC 점안액
위생적이고 편리한 1회용 포장과 리캡 가능한 제품
말랑한 용기로 사용하기 편리
눈물에 가장 가까운 성분으로 자극이 적은 점안액

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

염화나트륨(JP) 7.4mg

염화칼륨(JP) 1.3mg

히프로멜로오스(JP) 2mg

첨가제 : 히알루론산나트륨

[효능·효과]

눈의 피로, 누액의 보조(눈의 건조), 하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용시
불쾌감, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

[용법·용량]

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다.

점안 후 남은 액과 용기는 바로 버린다.

[포장단위] 30EA, 36EA

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

솔루펜 연질캡슐 (청색/무색)



Detail Point

이부프로펜 대비 13분 빠른 진통효과
색소에 민감한 분들을 위한 무색소 타입
Neo-Sol 특허공법의 연질캡슐제로서 생체이용률을 증가

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

덱시부프로펜(KP) 300mg

[효능·효과]

1. 만성 다발성 관절염, 류마티스관절염
2. 관절증
3. 강직척추염
4. 외상 및 수술 후 통증성 부종 또는 염증
5. 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

[용법·용량]

성인 : 덱시부프로펜으로서 1회 300mg을 1일 2~4회 경구투여한다.
단, 1일 덱시부프로펜으로서 1,200mg을 초과하지 않는다.

[포장단위] 10C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

솔루록센 연질캡슐



Detail Point

액상형의 강력한 소염 진통제
치통에도 효과적

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

나프록센(KP) 250mg

[효능·효과]

류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건(힘줄)염, 급성통풍, 월경근란증
다음 질환에도 사용할 수 있음 : 활액낭염, 골근격장애(염좌/뺨), 좌상, 외상, 요천통, 수술 후 동통(통증), 편두통, 발치 후 동통(통증)

[용법·용량]

1) 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염 - 성인 : 나프록센으로서 1회 250~500mg 1일 2회(12시간마다) 경구 투여한다. 2) 급성통풍 - 성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구투여하고 발작이 소실(사라짐)될 때까지 8시간 간격으로 250mg을 경구투여한다. 3) 골격근장애, 수술 후 동통(통증), 발치 후 동통(통증), 월경관란증, 건(힘줄)염, 활액낭염 - 성인나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 500mg을 경구투여한 후 6~8시간 간격으로 250mg씩 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다. 4) 편두통 - 성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg을 경구 투여한다. 필요하면 1일 250~500mg을 더 투여할 수 있으며 초회량(처음 복용량)의 투여 30분 후에 투여한다. 1일 총용량이 1,250mg을 초과하지 않도록 한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 10C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 물파스에프



Detail Point

찢어지지 않는 토출구
원조 토기표 꼬부라진 물파스

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

살리실산메틸(KP) 3g
dl-캄파(KP) 8g
L-멘톨(KP) 7g
클로르페니라민말레산염(KP) 0.1g
토코페롤아세테이트(KP) 0.1g
에녹솔론(BP) 0.05g

[효능·효과]

- 다음 증상의 소염 · 진통 : 뺨, 타박상, 근육통, 요통, 어깨결림, 신경통, 류마티스통증
- 동창
- 피부가려움, 벌레물린데

[용법·용량]

1일 1~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 88mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시노카엔 플러스 연질캡슐



Detail Point

카페인 무수물 첨가로 졸음 부작용 최소화
코감기약으로 유명한 '시노카' 브랜드

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

클로르페니라민말레산염(KP)	4mg
카페인무수물(KP)	20mg
벨라돈나총알칼로이드(JP)	0.2mg

[효능·효과]

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화:
코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용

[포장단위] 10C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시노플루콜드 연질캡슐



Detail Point

12C로 2일 동안 복용 가능한 용량

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	180mg
guaifenesin(KP)	20.84mg
슈도에페드린염산염(USP)	15mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	8mg
트리프루리딘염산염수화물(BP)	0.66mg

[효능·효과]

감기의 제증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래,
오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[포장단위] 12C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시로제노 연질캡슐



Detail Point

세티리진염산염으로 알러지 증상 완화에 효과적인 약물 발현 시간이 가장 짧고 강력한 효과 발휘

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

세티리진염산염(EP) 10mg

[효능·효과]

계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원인불명의) 두드러기, 피부 소양증(가려움증)

[용법·용량]

1. 성인 및 6세 이상의 소아 : 세티리진염산염으로서 1일 1회 10mg을 취침 전에 경구투여한다(복용한다).
2. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 투여한다.
3. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.
4. 신장장애(신장장애) 환자 : 투여 간격은 환자의 신기능에 따라 조절되어야 한다.

[포장단위] 10C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

시노타딘 연질캡슐



Detail Point

알러지와 두드러기에 사용할 수 있는 로라타딘 성분 줄음 관련 부작용이 적은 제품

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

로라타딘(USP) 10mg

[효능·효과]

1. 알레르기성 비염 증상(재채기, 콧물, 가려움, 눈의 작열감)의 일시적인 완화
2. 만성 특발성 두드러기 증상 완화

[용법·용량]

1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg을 경구투여한다.
2. 6~12세 미만의 소아
- 체중 30kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg 투여한다.

[포장단위] 10C/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

속시탈정



Detail Point

소화효소와 위장관 운동조절제가 함유된 복합성분 위장질환 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

메타규산알루미늄산마그네슘(KP) 40mg
탄산수소나트륨(KP) 50mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(별규) 20mg
스코폴리아엑스(KP) 5mg
리파제(별규) 7.5mg
감초가루(생규) 25mg
침강탄산칼슘(KP) 100mg
트리메틴말레산염(KP) 50mg

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용한다.

[포장단위] 10정/PTP

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

유린타민 캡슐



Detail
Point

전립선 비대증 치료효과가 논문으로 입증된
제품으로서 안정성과 효능 입증

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

글리신(KP) 45mg
L-알라닌(USP) 100mg
L-글루탐산(BP) 265mg

[효능·효과]

전립선비대에 의한 배뇨곤란·잔뇨 및 잔뇨감·빈뇨

[용법·용량]

성인 1회 2캡슐씩, 1일 3회 복용한다.

[포장단위] 180C, 360C(180C x 2EA)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

리버 350 연질캡슐



Detail
Point

실리마린 고함량 간질환 치료제
카르두스마리아누스엑스 350mg

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

밀크시슬열매건조엑스(생규) 350mg
(실리마린으로서 196mg)

[효능·효과]

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[포장단위] 120C(60C x 2EA), 60C(10C/PTP x 6)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

헤파멜즈산



Detail
Point

간질환 해독의 보조 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1포(3.6g) 중

L-아스파르트산-L-오르니틴(DAB) 3g

[효능·효과]

중증(심한 증상)의 간질환 해독의 보조치료(예 : 간경변)

[용법·용량]

L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1회 6g, 1일 2회 많은 양의 물을 녹여
식후에 복용한다.

[포장단위] 60포

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대아라미정



Detail Point

고함량 산화마그네슘 414.53mg
메코발라민 1,000μg 함유로 손발저림 개선

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

산화마그네슘(KP)	414.53mg
(마그네슘으로서 250mg)	
리보플라빈(KP)	20mg
메코발라민(KP)	1000μg
셀레늄함유건조효모(KP)	50mg
(셀레늄으로서 27μg)	
피리독신염산염(KP)	20mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	200mg
(비타민E로서 100 IU)	
감마-오리자놀(KP)	5mg

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민(E, B2, B6)의 보급:

- 육체피로, 임신, 수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

- 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[포장단위] 120정(60정/병 x 2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대아라비정



Detail Point

육체피로/근육통/신경통에 현대아라비정
활성형 비타민 3종 함유(리보플라빈부티레이트,
피리독살포스테이트수화물, 메코발라민)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

벤포티아민(KP).....	100mg (티아민염산염으로서 72.31mg)		
산화마그네슘(KP).....	30mg (마그네슘으로서 18mg)		
토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	40mg (비타민E로서 20 IU)		
산화아연(KP).....	20mg (아연으로서 16mg)		
콜레칼시페롤농축분말(EP).....	10mg (비타민D로서 1000 IU)		
셀레늄함유건조효모(KP).....	25mg (셀레늄으로서 13.5μg)		
리보플라빈부티레이트(KP).....	12mg	폴산(KP).....	0.5mg
피리독살포스테이트수화물(KP).....	5mg	아스코르브산(KP).....	100mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10mg	d-비오틴(USP).....	0.5mg
메코발라민(KP).....	1000μg	이노시톨(KP).....	30mg
니코틴산아미드(KP).....	100mg	판토텐산칼슘(KP).....	100mg
감마-오리자놀(KP).....	5mg	유비데카레논(KP).....	5mg

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민(E, B2, B6)의 보급:

- 육체피로, 임신, 수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량 / 구루병의 예방 / 각기 / 눈의 피로

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[포장단위] 120정(60정/병 x 2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 아시클로버 크림



Detail Point

구순포진, 생식기포진, 각종 바이러스 질환에
현대약품 아시클로버

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

아시클로버(BP) 50mg

[효능·효과]

단순포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과
구순(입술)포진(물집) 포함)

[용법·용량]

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
2. 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

[포장단위]

5g

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

메타지 크림



Detail Point

광범위 피부질환 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

베타메타손발레레이트(KP) 0.61mg

겐타마이신황산염(KP) 1mg(역가)

[효능·효과]

1. 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환: 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진, 박탈피부염, 가려움, 건선
2. 1도 화상

[용법·용량]

1일 1~3회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 35g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

나프젠액



Detail Point

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어
염증성변화를 수반하는 진균증(무좀)에 탁월한 효과
손·발톱무좀까지 사용 가능

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

나프티핀염산염(USP) 1.0g

[효능·효과]

다음의 피부진균증

- 1) 백선: 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증: 1일 1회(가능하면 취침시) 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱) 진균증: 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

나프젠크림



Detail Point

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어
염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과
손·발톱무좀까지 사용가능

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

나프티핀염산염(USP) 10mg

[효능·효과]

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

[용법·용량]

- 1) 피부진균증 : 1일 1회(가능하면 취침시) 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱) 진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

[포장단위] 30g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

댄스탑 외용액



Detail Point

주 작용인 항균작용 외에도 보습제가 함유되어 있어
두피의 보습을 유지시켜주는 효과를 함께 가지고 있는 제품

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

케토코나졸(USP) 2g

[효능·효과]

효모균(Pityrosporum)에 의한 다음의 피부질환 : 비듬, 지루피부염, 어루러기

[용법·용량]

감염부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분간 적용한 후 행구어 낸다.

[포장단위] 100mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

바디드란트액



Detail Point

효과적인땀억제와 낮은자극성으로 겨드랑이·손·발등
다양한 부위에 사용 가능한롤온(Roll-on)타입 다한증치료제

[전성분] 100ml 중

염화알루미늄수화물(BP) 12g

[효능·효과]

겨드랑이, 손, 발의 다한증(땀과다증)

[용법·용량]

저녁에 적용 부위에 적당량을 바른 후 다음날 아침 물로 씻어 제거한다.
발한(땀이 남)이 멈출 때까지는 매일 밤 한번씩 사용하고 증상이 호전
(나아짐)될 경우에는 일주일에 1~2회로 줄인다.

[포장단위] 30mL

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃이하 서늘한 곳 보관

누보클렌액



Detail Point

3無 무색 무취 무자극
영아 배꼽 소독 가능

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

클로르헥시딘글루콘산염(EP)	1.0mL
(클로르헥시딘글루콘산염으로 0.2g 해당량)	
디펜히드라민염산염(USP)	0.3g
디부카인염산염(USP)	0.1g
나파졸린염산염(USP)	0.1g
알란토인(USP)	0.2g

[효능·효과]

긁힌 상처, 베인 상처, 창상, 손과 손가락의 살균, 소독, 치질인 경우의 항문 살균 소독

[용법·용량]

1일 1회~수회 적당량을 환부에 바른다.

[포장단위] 50mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

케프로텍 카타플라스마 (5매)



Detail Point

케프로텐 50.14mg 함량
수분이 많아 빠르고 강력하게 약물 전달

[원료약품 및 그 분량] 1매(9cm×13cm 11.7g 중)

케토프로펜(KP)	50.14mg
-----------	---------

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창·동통

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1일 2회 환부(질환부위)에 부착한다.

[포장단위] 5매

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

플루펜 카타플라스마 (5매)



Detail Point

비스테로이드성 소염진통제 '플루르비프로펜'을
함유한 첩부제

[원료약품 및 그 분량] 1매(8×12cm, 6.9g) 중

플루르비프로펜(KP)	27.4mg
-------------	--------

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염):

퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염(힘줄윤활막염), 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

[용법·용량]

약면의 박리(벗겨내기/벗겨짐)지를 떼어낸 후 1일 2회 환부(질환부위)에 부착한다.

[포장단위] 5매

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

케프로텍 플라스타 (40매)



Detail Point

빠르고 시원하게 통증을 해결
고무 기반으로 우수한 접착력

[원료약품 및 그 분량] 1매(7cm×10cm, 2g 중) 중

케토프로펜(KP) 30mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) :
퇴행성관절염(골(뼈)관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄) · 건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상(상처) 후의 종창(부기) · 동통(통증)

[용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 환부(질환부위)에 1일 2회 부착한다.

[포장단위] 40매/포(10매 X 4포)

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

디나펜 플라스타 (40매)



Detail Point

쿨한 사용감과 24시간 지속 효과
강한 탄성과 우수한 접착력

[원료약품 및 그 분량] 약 1매(70cm, 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) 15mg

[효능·효과]

- 1) 퇴행성관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 힘줄 및 힘줄윤활막염 4) 힘줄주위염
- 5) 위팔뼈상과염(테니스엘보 등)
- 6) 근육통(근, 근막성요(허리)통증 등)
- 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

[용법·용량]

성인(15세 이상) : 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙인다.
단, 15세 미만은 사용하지 않습니다.

[포장단위] 40매

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

현대 에어파스맥스



Detail Point

빠른 소염·진통작용 분사력·청량감 강화,
사용이 간편한 원터치 캡

[원료약품 및 그 분량] 100g 중

L-멘톨(KP) 5.02g

dl-캄파(KP) 4.71g

살리실산메틸(KP) 2.75g

디펜히드라민(KP) 0.063g

[효능·효과]

뻐데, 멍든데, 타박상, 근육통 치료의 보조

[용법·용량]

1일 1회 ~ 수회 환부에 적당량을 분무한다.

[포장단위] 200mL

[저장방법] 기밀용기, 직사광선을 피해 실온의 건조한 곳에 보관

블리스텍스 센시티브



Detail Point

코코아버터와 시어버터 추출물 함유
민감한 입술에 저자극성 보습효과

[전성분]

페트롤라툼, 카카오씨드버터, 하이드록시스테아릭에씨드, 쉐어버터, 페녹시에탄올

[효능·효과]

민감한 입술에 저자극성의 보습 효과와 편안함 제공

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

4.25g

[저장방법]

제조일로부터 4년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 딥 리뉴얼



Detail Point

코엔자임큐텐, 히알루론산 함유로 건강한 입술유지
탁월한 보습효과

[전성분]

호호바에스터, 캐스터씨유, 다이메티콘, 비즈왁스, 민트오일, 마이크로크리스탈린왁스

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

3.7g

[저장방법]

제조일로부터 4년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 립 릴리프 크림



Detail Point

튼 입술 보호와 수분공급을 통한 재생 효과
탁월한 치료효과, 탁월한 흡수력과 지속력
자외선 차단효과

[전성분]

알란토인, 옥시벤존, 페디메이트, 비즈왁스, 라놀린, 미네랄오일, 육계나무잎 추출물, 페퍼민트오일

[효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

6mL

[저장방법]

제조일로부터 4년(제조일자 제품밀면 표기)

블리스텍스 립 바이브런스



Detail Point

입술의 톤을 살려주는 아름다운 색조와 켈의 조화
강력한 고보습 제품

[전성분]

다이메티콘, 옥시벤존, 옥티녹세이트, 향료, 미네랄오일,
마이크로크리스탈린왁스, 아주까리씨유, 포도씨유

[효능·효과]

강력한 보습효과로 민감한 입술의 보호

[용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 준다.

[포장단위]

3.69g

[저장방법]

제조일로부터 4년(제조일자 제품밀면 표기)

폼포미 뉴 하이드로패치(잘라쓰는 타입)



Detail Point

상처 부위에 폼포미 뉴 하이드패치

[전성분]

폴리우레탄, 하이드로콜로이드점착테이프

[효능·효과]

상처 부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

[용법·용량]

환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 붙인다.

[포장단위]

소형 50mm x 100mm 2매, 100mm x 100mm 2매

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

폼포미 플러스 아쿠아밴드(표준형)



Detail Point

내 피부 상처를 보호할 땐,
폼포미 플러스 아쿠아 밴드!

[전성분]

비닐점착테이프, 폴리에틸렌망으로 덮인 부직포 패드, 종이필름

[효능·효과]

상처부위, 환부 등의 보호

[용법·용량]

환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.

[포장단위]

72mm x 25mm 20매

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

폼포미 플러스 아쿠아 밴드(혼합형)



Detail Point

내 피부 상처를 보호할 땐,
폼포미 플러스 아쿠아 밴드!

[전성분]

비닐점착테이프, 폴리에틸렌망으로 덮인 부직포 패드, 종이필름

[효능·효과]

상처부위, 환부 등의 보호

[용법·용량]

환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.

[포장단위]

72mm × 25mm 20매, 38mm × 38mm 12매
72mm × 38mm 4매, 58mm × 51mm 4매

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

마이실 빠른 허브 헤어칼라 1호(진한흑색)



Detail Point

옷 걱정 줄인 빠른 염색약,
20가지 식물성분 함유로 촉촉하고, 부드럽게!

[원료약품 및 그 분량] 1pack 중

염모제 전성분

- 1제 : 정제수, 우레아, 세테아릴알코올, 글리세릴스테아레이트, 갈릭애씨드, 세테스-20, 미네랄오일, 에탄올아민티오글라이콜레이트, 포타슘하이드록사이드, 다이프로필렌글라이콜, 암모늄바이카보네이트, 소듐살리실레이트, 아스코빅애씨드, 스테아트라이모늄클로라이드, 소듐셀파이트, 탄닌애씨드, 세테스-10, 에칠헥실메톡시신나메이트, 부틸렌글라이콜, 암모늄글리시리제이트, 아이소프로필알코올, 쉑잉추출물, 장미추출물, 하이드록시에틸셀룰로오스, 올레익애씨드, 아이소프로필미리스테이트, 베헤닐알코올, 페녹시에탄올, 리놀레익애씨드, 스테아릭애씨드, 아라키딕알코올, 1,2-헥산다이올, 에틸헥실글리세린, 스테아릴알코올, 리놀레익애씨드, 비에이치티, 폴리솔베이트60, 다이소듐포스페이트, 마카다미아씨오일, 메도우썬씨오일, 스위트아몬드오일, 아르간커널오일, 바오밥나무오일, 카멜리아씨오일, 아사이팜열매오일, 감초추출물, 동백나무잎추출물, 캐럽열매추출물, 마데카소사이드, 소듐포스페이트, 세테스-15, 병풀추출물, 일랑일랑꽃추출물, 캐모마일꽃수, 라벤더꽃수, 페퍼민트잎수, 로즈마리잎수, 커먼자스민꽃수, 폴스애플민트잎추출물, 히비스커스꽃추출물, 아시아타코사이드, 아시아틱애씨드, 마데카식애씨드, 향료, 헥실신남알, 리모넨, 리날롤, 부틸페닐메틸프로피오날, 쿠마린

- 2제 : 정제수, 페러스셀레이트, 세테아릴알코올, 세테스-20, 미네랄오일, 부틸렌글라이콜, 세트리모늄클로라이드, 아스코빅애씨드, 세테스-10, 세테스-15

[효능·효과] 모발(백모)의 염모

[용법·용량] 사용 시의 주의사항은 첨부문서를 참조하십시오.

[내용물]

1제 100g, 2제 100g, 비닐가운, 비닐장갑, 염색뿔/빗, 도포용기, 사용설명서



식이섬유 2,500mg 함유
칼로리는 35kcal로 가볍게

[전성분]

식이섬유 2,500mg 함유

[포장단위]

100ml

[저장방법]

직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관





